

PATIENTKORT

Welireg ▼ (belzutifan)

- Ta inte WELIREG för von Hippel-Lindaus sjukdom om du är gravid.
- Om du är gravid och behöver behandling för njurcellscancer, prata med din läkare om användning av WELIREG.
- WELIREG kan skada fostret och orsaka missfall. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.
- Du kommer att få göra ett graviditetstest innan du börjar ta WELIREG.
- Du ska inte bli gravid medan du tar WELIREG.

Preventivmedel

- Om du är en kvinna som kan bli gravid:
 - Preventivmedel som innehåller hormoner, såsom p-piller, p-sprutor eller p-plåster kan fungera sämre medan du tar WELIREG.
 - Medan du tar WELIREG och i minst en vecka efter din sista dos ska du:
 - Använda ett effektivt icke-hormonellt preventivmedel eller
 - Se till att din manliga partner använder kondom.
- Prata med din läkare eller apotekspersonal om preventivmedel som kan passa för dig medan du tar WELIREG.
- Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan ha blivit gravid under behandlingen.

För mer information, se bipacksedeln för WELIREG som innehåller information för patienten.

Viktig kontaktinformation

Läkarens namn _____
Telefon kontorstid _____
Telefon efter kontorstid _____
Mitt namn _____

