

Potilaskortti

Pidä tämä kortti mukanasasi tai Enbrelä saavan lapsen mukana vielä 2 kk ajan viimeisen Enbrel-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä Enbrel-hoidon päätyttyäkin.

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tai Enbrelä saavan lapsen tulee tietää ennen Enbrel-hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Jos jokin kortin seikka jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selittämään se sinulle.

- Näytä tämä kortti kaikille sinua tai lasta hoitaville lääkäreille.
- Ks. lisätiedot Enbrel-valmisteen pakkausselosteesta.
- Sinun ja lääkärisi on tärkeää muistaa merkitä muistiin saamasi lääkkeen nimi ja eränumero.

Infektiot

Enbrel voi suurentaa riskiä saada jokin, ehkä vakavakin, infektio.

- Älä käytä Enbrelä, jos sinulla tai Enbrelä saavalla lapsella on jokin infektio. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.
- Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle tai Enbrelä saavalle lapselle kehittyä infektioihin viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittynyttä yskää, painon laskua tai voimattomuutta.
- Sinut tai Enbrelä saava lapsi on tutkittava tuberkuloosin varalta. Lääkäri merkitsee viimeisimmän tuberkuloositutkimuksen päivämäärän ja tulokset tähän.

Testi: _____

Päivämäärä: _____

Tulokset: _____

Testi: _____

Päivämäärä: _____

Tulokset: _____

- Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut lääkkeesi tai Enbrelia saavan lapsen lääkkeet, jotka voivat suurentaa riskiä saada infektio.

Potilaan nimi: _____

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin puhelinnumero: _____

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan (www.fimea.fi, Haittavaikutuksista ilmoittaminen) tai Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.