

IMLYGIC® (talimogeenilaherparepveekki)

POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISTENSÄ OPAS

Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on hyvä perehtyä ennen kuin Imlygic-hoito aloitetaan ja hoidon aikana.

Lue tämä opas huolellisesti ennen jokaista hoitokertaa ja jokaisen hoitokerran jälkeen. Lue myös Imlygic-valmisteen pakkausseloste, jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai jos jokin asia huolestuttaa sinua.

MITÄ MINUN PITÄISI TIETÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA?

- Imlygic on heikennetty tyyppi 1 *Herpes simplex* -virus (HSV 1), jota kutsutaan yleisesti huuliherpesvirukseksi (yskänrokkovirukseksi), ja sitä käytetään melanoomaksi kutsutun ihosyövän hoitoon.
- Imlygic voi aiheuttaa hengenvaarallisen herpesinfektion. Se on yleisempi potilailla, joiden **immuunijärjestelmän toiminta on heikentynyt**.
- Imlygic-valmistetta **ei saa käyttää raskauden aikana**, ellei mahdollinen hyöty potilaalle oikeuta sikiölle koituvaa mahdollista riskiä.
- Imlygic voi **vahingoittaa sikiötä**. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.
- Sinulle voi kehittyä Imlygic-hoidon aikana tai sen jälkeen huuliherpes (yskänrokko) tai **vakavampi herpesinfektio**, joka voi levitä muualle kehoon.
- Imlygic-virus **voi tarttua myös läheisiisi** (samassa taloudessa asuviin, sinusta huolehtivaan henkilöön, seksikumppaniisi tai samassa sängyssä nukkuvaan ihmiseen), jos he ovat **suoraan kosketuksessa** ruumiinnesteiden tai pistoskohdan kanssa.
- Kerro nämä tiedot myös läheisillesi, erityisesti niille, jotka ovat raskaana tai joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt.
- Pistoskohdat on pidettävä koko ajan ilma- ja vesitiiviillä sidoksilla peitettynä. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhdas side.

HERPESINFEKTION OIREITA OVAT ESIMERKIKSI:

- Kipu, kuumotus, kirvely tai rakkulat, joita voi ilmaantua suun ympärille, sukuelimiin tai muualle kehoon lähelle pistoskohtaa tai etäälle siitä
- Silmäkipu, valonarkuus, silmän rähmiminen, punoitus, kyynelvuoto tai näön hämärtyminen
- Heikkouden tunne käsissä tai jaloissa
- Voimakas uneliaisuus (väsymyksen tunne)
- Kuume, johon liittyy päänsärkyä
- Oksentelu
- Sekavuus
- Muistinmenetykset
- Kouristuskohtaukset



KERRO HETI LÄÄKÄRILLE, JOS SINULLE ILMAANTUU JOKIN NÄISTÄ OIREISTA TAI MITÄ TAHANSA UUSIA OIREITA IMLYGIC-HOIDON AIKANA TAI JÄLKEEN.

Ilmaantuvista rakkuloista voidaan ottaa näyte, jotta saadaan selville, ovatko ne Imlygic-hoidon aiheuttamia.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

MITEN MINUN ON TOIMITTAVA IMLYGIC-HOIDON AIKANA?

- Vältä läheistesi joutumista suoraan kosketukseen pistoskohdan tai ruumiinnesteiden kanssa:
 - Hoitoa saaneen potilaan on **toimittava niin, etteivät läheiset joudu kosketuksiin** hänen verensä ja ruumiinnesteidensä kanssa Imlygic-hoidon aikana ja **30 vuorokauden ajan viimeisen Imlygic-annoksen jälkeen**. Noudata tämän vuoksi seuraavia ohjeita:
 - Älä ole yhdynnässä ilman lateksikondomia
 - Älä suutele, jos jommallakummalla teistä on avoin haava suussa
 - Älä käytä yhteisiä ruokailuvälineitä, astioita tai juomalaseja
 - Älä käytä yhteisiä injektioneuloja, parranajovälineitä tai hammasharjoja
 - Älä koskettele tai raavi pistoskohtaa.
- Pidä pistoskohta koko ajan ilma- ja vesitiiviillä siteellä peitettynä. Jos pistoskohdasta vuotaa tai tihkuu eritettä, pidä side paikoillaan, kunnes eritevuoto tai tihkuminen on loppunut. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhdas side.
- Laita käytetyt sidemateriaalit ja puhdistustarvikkeet suljettavaan muovipussiin ja hävitä ne talousjätteiden mukana pussiin suljettuina, jotta samassa taloudessa asuvat eivät joudu suoraan kosketukseen niiden kanssa.

MITÄ MINUN PITÄISI KERTOA LÄHEISILLENI IMLYGIC-HOIDOSTA?

Neuvo heitä

- välttämään suoraa kosketusta ruumiinnesteidesi tai pistoskohtien kanssa.
- käyttämään suojakäsineitä aina sidettäsi vaihtaessaan.
- puhdistamaan altistunut alue vedellä ja saippualla ja/tai desinfiointiaineella, jos he altistuvat vahingossa Imlygic-valmisteelle. Jos heille ilmaantuu herpesinfektion merkkejä tai oireita, kehoita heitä ottamaan yhteyttä lääkäriin.
- Läheisten epäillyistä herpesrakkuloista voidaan ottaa näyte, jotta saadaan selville, ovatko ne Imlygic-hoidon aiheuttamia.

Jos läheisesi on raskaana tai hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt, hän ei saa vaihtaa siteitäsi eikä puhdistaa pistoskohtaasi.

KESKUSTELE LÄÄKÄRIN TAI SAIRAAHOITAJAN KANSSA, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä terveydenhuollon ammattilaiselle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

(www-sivusto: www.fimea.fi)

Kerro aina potilaskorttiisi merkitty eränumero, kun ilmoitat haittavaikutuksista.

Tässä oppaassa ei ole kaikkia sinulle tärkeitä Imlygic-valmisteen turvallisuustietoja. Lue lisätietoja Imlygic-valmisteen pakkausselosteesta, jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Lue pakkausseloste jokaisen pistoskerran yhteydessä, sillä tiedot saattavat muuttua ajan myötä.