

# IMLYGIC® (talimogen laherparepvek)

## INFORMATION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

**Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under behandlingen med Imlygic.**

**Läs denna information noga före och efter varje behandling.**

**Läs också bipacksedeln för Imlygic som du får av din läkare.**

**Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har några frågor eller funderingar om behandlingen.**

### VAD BEHÖVER JAG VETA OM IMLYGIC?

- Imlygic är en försvagad form av herpes simplex-virus typ-1 (HSV-1), som vanligen kallas munsårsvirus, och används för att behandla en typ av hudcancer som heter melanom.
- Imlygic kan orsaka livshotande herpesinfektioner. Det är vanligare hos patienter med **nedsatt immunförsvar**.
- Imlygic ska **inte användas under graviditet** om inte den potentiella nyttan uppväger den potentiella risken för det ofödda barnet.
- Imlygic kan **skada ofödda barn**. Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid.
- Under eller efter behandlingen med Imlygic kan du drabbas av munsår eller en **allvarligare form av herpesinfektion** som kan sprida sig till andra delar av kroppen.
- Imlygic-virus kan **överföras till dina närstående** (familjemedlemmar, vårdgivare, sexpartner eller någon som du delar säng med) om de kommer i **direktkontakt** med kroppsvätskor från dig eller med injektionsställena.
- Dela denna information med dina närstående, i synnerhet om de är gravida eller har nedsatt immunförsvar.
- Injektionsställena ska alltid hållas täckta med lufttäta och vattentäta täckförband. Sätt på förbandet enligt de anvisningar du har fått av vårdpersonalen. Om förbandet lossnar eller ramlar av ska du omedelbart sätta på ett nytt.

### TECKEN OCH SYMTOM PÅ HERPESINFEKTION ÄR BLAND ANNAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL:

- Smärta, en brännande känsla, stickningar, eller blåsbildning runt munnen, könsorganen eller någon del av kroppen, nära eller långt från injektionsstället
- Ögonsmärta, ljuskänslighet, utsöndringar från ögonen, röda ögon, rinnande ögon eller dimsyn
- Svaghet i armar eller ben
- Mycket kraftig dåsighet (känna sig sömnig)
- Feber förknippad med huvudvärk
- Kräkningar
- Förvirring
- Minnesförlust
- Kramper



**OM DU FÅR NÅGOT AV DESSA SYMTOM ELLER ANDRA NYA SYMTOM UNDER ELLER EFTER BEHANDLINGEN MED IMLYGIC SKA DU OMEDELBART TALA OM DET FÖR LÄKAREN.**

Alla typer av sår som bildas kan testas för att kontrollera om de har orsakats av Imlygic.

**Se ytterligare information på nästa sida.**

## VAD SKA JAG GÖRA UNDER BEHANDLINGEN MED IMLYGIC?

- Se till att närstående inte kommer i direktkontakt med injektionsställena och kroppsvätskor från dig:
  - Den behandlade patienten ska **minimera risken för att närstående exponeras** för blod och kroppsvätskor under hela behandlingen med Imlygic samt till och med **30 dagar efter den sista dosen av Imlygic**. Det gör du genom att följa nedanstående anvisningar:
    - Ha inte samlag utan latexkondom
    - Kyss inte en person om någon av er har ett öppet munsår
    - Dela inte bestick, porslin och glas
    - Dela inte injektionskanyler, rakblad eller tandborstar
    - Vidrör inte och klia inte på injektionsstället.
- Håll alltid injektionsställena täckta med luft- och vattentäta förband. Om injektionsstället utsöndrar vätska ska förbandet sitta kvar tills vätskeutsöndringen har upphört. Sätt på förbandet enligt de anvisningar du har fått av vårdpersonalen. Om förbandet lossnar eller ramlar av ska du omedelbart sätta på ett nytt.
- Lägg alla använda förband och tvättmaterial i en plastpåse, förslut den och kasta den i hushållsavfallet, så att inte medlemmar i hushållet kommer i direktkontakt med dem.

## VAD SKA JAG BERÄTTA FÖR MINA NÄRSTÅENDE NÄR JAG BEHANDLAS MED IMLYGIC?

- Undvika direktkontakt med dina kroppsvätskor och injektionsställena.
- Använda handskar när de byter dina täckförband.
- Tvätta det drabbade området med tvål och vatten och/eller ett desinficerande medel om de av misstag kommer i kontakt med Imlygic. Om de drabbas av tecken eller symtom på en herpesinfektion ska du uppmana dem att kontakta läkare.
- Misstänkta herpesår på närstående kan testas för att kontrollera om de har orsakats av Imlygic.

**Om någon av dina närstående är gravid eller har nedsatt immunförsvar ska de inte byta dina täckförband eller göra rent dina injektionsställena.**

## TALA MED DIN LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM BEHANDLINGEN MED IMLYGIC.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

(webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi))

Ange alltid batchnumret som står på patientkortet när du rapporterar biverkningar.

Denna broschyr innehåller inte all viktig säkerhetsinformation du behöver känna till om Imlygic. Läs bipacksedeln för Imlygic som du får av din läkare för att få mer information. Läs den varje gång du får en injektion, eftersom informationen i den kan komma att ändras med tiden.