

Tämä muistutuskortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa, josta sinun on oltava tietoinen ennen denosumabi-pistosten (Jubereq) aloittamista syöpään liittyvien sairauksien hoitoon sekä hoidon aikana.

Lääkärisi on suositellut sinulle denosumabi-pistoksia ehkäisemään luustoetäpesäkkeiden tai luusyöpien aiheuttamia luihin kohdistuvia vaikutuksia (esimerkiksi luunmurtumia).

Leukaluun osteonekroosiksi (leukaluun luukuolio) kutsuttua haittavaikutusta on raportoitu yleisesti (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä) potilailla, jotka saavat denosumabi-pistoksia (Jebereq) syöpään liittyvien sairauksien hoitoon. Leukaluun luukuolio voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.

On tärkeää pyrkiä ehkäisemään leukaluun luukuolion kehittymistä, koska se voi olla kivulias ja vaikeahoitoinen tila, jota voi olla vaikea hoitaa. Leukaluun luukuolion kehittymisen riskin pienentämiseksi on olemassa muutamia varotoimia, joita sinun tulisi noudattaa:

Ennen hoidon aloittamista:

- Tarkista lääkäriltäsi, pitäisikö sinun käydä hammastarkastuksessa ennen denosumabi-hoidon (Jubereq) aloittamista.
- Kerro lääkärillesi/sairaanhoitajallesi (terveydenhoitohenkilökunnalle), jos sinulla on suuhun tai hampaisiin liittyviä ongelmia.

Potilailla, joille tehdään hammasleikkauksia (esimerkiksi hampaanpoisto), jotka eivät saa säännöllistä hammashoitoa tai joilla on iensairaus, jotka tupakoivat tai jotka saavat erilaisia syöpähoitoja, voi olla suurempi riski leukaluun luukuolion kehittymiselle.

Hoidon aikana:

- Sinun on huolehdittava hyvästä suuhygieniasta ja käytävä säännöllisissä hammastarkastuksissa. Jos sinulla on hammasproteesi, sinun tulisi huolehtia, että se istuu hyvin.
- Jos saat parhaillaan hammashoitoa tai olet menossa hammasleikkaukseen (esimerkiksi hampaanpoistoon), ilmoita tästä lääkärillesi ja kerro hammaslääkärillesi että sinua hoidetaan denosumabilla (Jubereq).

- Ota heti yhteyttä lääkäriisi ja hammaslääkäriisi, jos sinulla ilmenee suuhun tai hampaisiin liittyviä ongelmia, kuten heiluvia hampaita, kipua tai turvotusta, huonosti paranevia haavoja tai eritevuotoa, sillä nämä voivat olla merkkejä leuan luukuoliosta.

Lue lisätietoja lääkkeen mukana toimitettavasta pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, farmaseutille tai hoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

www.fimea.fi

tai voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan myyntiluvan haltijalle:

Accord Healthcare Oy, Oksasenkatu 10 A 6,

00100 Helsinki, puh. 010 2314 180,

www.accord-healthcare.fi