

POTILASKORTTI Rivaroxaban Avansor 2,5 mg Rivaroxaban Avansor 10 mg Rivaroxaban Avansor 15 mg Rivaroxaban Avansor 20 mg ♦ Pidä tämä kortti aina mukanas ♦ Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä  AVANSOR PHARMA	Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Avansor-valmisteesta? ♦ Rivaroxaban Avansor ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen. ♦ Ota Rivaroxaban Avansor-valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, kun otat sinulle määrätyt annokset säännöllisesti. ♦ Älä lopeta Rivaroxaban Avansor-valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.	♦ Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Avansor-valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa. ♦ Kerro aina että käytät Rivaroxaban Avansor-valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide. Milloin tarvitsen lääkärin apua? Rivaroxaban Avansor-valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Avansor-valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.	Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista: ♦ kipua ♦ turvotusta tai epämukavuutta ♦ päänsärkyä, huimausta tai heikotusta ♦ epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan ♦ tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä ♦ virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia	♦ yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia Miten otan Rivaroxaban Avansor-valmistetta? ♦ Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Avansor - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa
Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Avansor (rivaroksabaani). Nimi: Osoite: Syntymäaika: Paino: Muut lääkkeet/sairaudet:	Hätätapauksissa ilmoittakaa: Lääkärin nimi: Lääkärin puhelin: Lääkärin leima:	Ilmoittakaa myös: Nimi: Puhelin: Suhde potilaaseen:	Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta alla. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 00034 Fimea	Sekä Avansor Pharma Oy Tekniikantie 14 02150 Espoo info@avansorpharma.fi Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle: ♦ INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Avansor-valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti. Versio 3.0 Fimea hyväksynyt 18.12.2020 ARTDB027427P 02.10.2024