

Tuberkuloosikoeket ja hoito
(Keskustele lääkärin kanssa, jos olet epävarma) Merkitse ruutuun, onko sinulta **joskus otettu tuberkuloosikoe:**

☒ Kyllä

Merkitse ruutuun, oletko **joskus saanut positiivinen löydöksen tuberkuloosista:**

☒ Kyllä ☐ Ei

Merkitse ruutuun, oletko **joskus saanut hoitoa tai lääkitystä tuberkuloosiin tai sen ehkäisyyn:**

☒ Kyllä ☐ Ei

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Celltrion Healthcare Finland Oy.

Potilaskortti aikuisille

- Pidä tämä kortti aina mukanasasi hoidon aikana ja neliän kuukauden ajan viimeisestä Yuflyma-injektioista.
- Näytä tämä kortti kaikille lääkäreille tai terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla käyt.
- Kirjaa tämän kortin sisäisivä kaikki sinulle mahdollisesti tehdyt tuberkuloosikokeet ja käyttämäsi tuberkuloosilääkkeet.

Kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia ei ole lueteltu tässä kortissa. Lue Yuflyma-valmisteen pakkausseloste tai keskustele lääkärin kanssa saadaksesi lisää tietoa haittavaikutuksista.

110mm

Fold

Fold

Fold

Yuflyma on lääke, joka on tarkoitettu tiettyyn immuunijärjestelmän osaan vaikuttavien sairauksien hoitoon. Yuflyma voi olla tehokas näiden sairauksien hoidossa, mutta joillekin se voi aiheuttaa haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Yuflyma-valmisteen mahdollisista hyödyistä ja haittavaikutuksista. Nämä voivat olla yksilöllisiä.

- Tässä kortissa kerrotaan joistakin Yuflyma-valmisteiden mahdollisista haittavaikutuksista.
- Mahdollisia vakavia haittavaikutuksia ovat infektiot, syöpä ja hermostohäiriöt.
- Tässä ei ole mainittu kaikkia Yuflyma-valmisteiden mahdollisia haittavaikutuksia.

Kerro lääkärille terveysongelmistasi ja jo käyttämästäsi lääkkeistä. Tämä auttaa lääkäriä päättämään, sopiiko Yuflyma sinulle.

Kerro lääkärille, jos:

- sinulla on jokin infektio tai sen oireita (kuten kuume, haavaumia, väsymyksen tunnetta tai hampsaongelmia)
- sairastat tuberkuloosia tai olet ollut tuberkuloosia sairastavan henkilön läheisyydessä
- sinulla on tai on ollut syöpä
- sinulla on tunnotonmuuttua tai pistelyä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippleiskleroosi).

- Sinulle voidaan antaa muita kuin eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
- Jos olet saanut Yuflyma-valmistetta raskauden aikana, siitä on hyvä kertoa lapsen lääkärille ennen kuin lapselle annetaan rokotuksia. Lapselle ei saa antaa eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, kuten calmetterokotusta (tuberkuloosin ehkäisyyn), viiteen kuukauteen viimeisestä raskauden aikana annettusta Yuflyma-injektioista.

Jotta Yuflyma-hoito olisi tehokas ja turvallinen, sinun on käytävä säännöllisesti lääkärin vastaanotolla keskustelemassa voinnistasi. Kerro heti lääkärille, jos yleistilassasi tapahtuu muutoksia.

On tärkeää, että soitat lääkärille heti, jos saat epätavallisia oireita. Tällä varmistetaan se, että saat oikeaa hoitoa. Se myös vähentää haittavaikutusten pahenemisriskiä. Monia haittavaikutuksia, kuten infektioita, voidaan hoitaa, jos kerot niistä heti lääkärille.

- Jos saat haittavaikutuksen, lääkäri päättää, voitko jatkaa Yuflyma-hoitoa vai pitääkö se lopettaa. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa siitä, mikä on hyväksi sinulle.
- Koska haittavaikutuksia voi ilmentyä myös viimeisen Yuflyma-annoksen jälkeen, kerro lääkärille kaikista sinulla mahdollisesti esiintyvistä oireista neljän kuukauden ajan viimeisestä Yuflyma-injektiosta.

- uusista sairauksistasi
- uusista käyttämästäsi lääkkeistä
- sinulle suunnitelluista leikkauksista ja toimenpiteistä.

Infektio: Yuflyma-valmistetta käytetään tiettyjen tulehduksellisten sairauksien hoitoon. Se tehoaa estämällä immuunijärjestelmän tietyn osan toimintaa. Tämä immuunijärjestelmän osa auttaa kuitenkin myös elimistöä taistelemaan infektioita vastaan. Tämän vuoksi Yuflyma voi saada aikaan sen, että olet alttiimpi saamaan infektioita tai ollemaassa oleva infektioisi pahenee. Näihin kuuluvat myös nuhakuumeet ja vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.

Hermosto: Joillekin henkilöille on kehittynyt uusia tai pahenevia hermostohäiriöitä adalimumabihoiton aikana. Näihin kuuluu multippelistleroosi.

Kattavat tiedot löydät Yuflyma-valmisteen pakkausselosteesta. Tässä ei mainita kaikkia Yuflyma-hoidon aikana mahdollisesti ilmaantuvia haittavaikutuksia.

Infektio: kuume, vilunväristykset, epätavallinen hikoilu, huonovointisuus tai epätavallinen väsymys, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, mahakipu, ruokahaluttomuus tai painonlasku, yskä tai veri- tai limayskökset, hengenahdistus, virtsaamisvaikeudet, ihohaava tai -haavauma, lihaskipu, hammassongelmat.

Syöpä: yöhikoilu, imusolmukkeiden turpoaminen kaulalla, kainaloissa, nivusissa tai muualla kehossa, painonlasku, uudet tai muuttuneet ihomuutokset (kuten pigmenttiluomet tai pisaamat), vaikea selittämätön kutina.

Hermosto: pistely tai puutuminen, näkökyvyn muutokset, lihasheikkous, odottamaton huimaus.

Kerro lääkärille kaikista Yuflyma-hoidon aikana ilmaantuvista epätavallisista oireista. Tässä ei mainita kaikkia haittavaikutusten mahdollisia oireita.

Kattavat tiedot löydät Yuflyma-valmisteen pakkausselosteesta. Jos sinulla on muuta kysyttävää, käänny lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.