

Patientkort CARVYKTI® (ciltakabtagen-autoleucel)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan rapportera biverkningar till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA eller via www.fimea.fi.

PATIENTENS NAMN:

Kontaktuppgifter vid en nödsituation

**NAMN PÅ PATIENTENS
VÅRDARE/ANHÖRIG:**

**TELEFONNUMMER TILL
PATIENTENS VÅRDARE/
ANHÖRIG:**

VIK HÄR

Primär CAR-T-vårdgivare

NAMN PÅ VÅRDGIVARE:

**TELEFONNUMMER TILL
VÅRDGIVARE:**

**ADRESS TILL
CAR-T-KLINIKEN:**

**TELEFONNUMMER TILL
CAR-T-KLINIKEN:**

VIK HÄR

Viktig information till patienter

Ha alltid med dig det här kortet. Visa det för varje läkare du träffar och när du uppsöker sjukhuset.

Tala om för den vårdgivare du träffar att du har behandlats med ciltakabtagen-autoleucel.

Planera för att stanna kvar i närheten av sjukhuset där du fick behandling under minst 4 veckor efter att du har givits ciltakabtagen-autoleucel.

Framför inte fordon och använd inte verktyg eller maskiner förrän tidigast 8 veckor efter infusionen av ciltakabtagen-autoleucel. Se bipacksedeln för mer information.

VIK HÄR

Om du upplever några nya symtom, särskilt några av de symtom som listas på det här kortet, ska du omedelbart kontakta läkare, behandlande vårdgivare eller annan tillgänglig vårdgivare.

Ciltakabtagen-autoleucel kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen. Dessa symtom kan vara livshotande eller till och med dödliga och behöver åtgärdas omedelbart.

Symtom som tycks milda kan snabbt förvärras.

Symtom kan vara fördröjda och uppkomma veckor efter infusionen.

**Kontakta omedelbart din behandlande
vårdgivare om du får något av följande symtom:**

Cytokinfrisättnings- syndrom (CRS)

Feber (38 °C eller högre)
Frossa
Snabba hjärtslag
Andningssvårigheter
Yrsel eller ostadighetskänsla

Neurologisk toxicitet

Förvirringskänsla
Mindre uppmärksam,
desorienterad, ångest
eller minnesförlust
Talsvårigheter eller sluddrigt tal
Långsamma rörelser eller
förändringar av handstil

VIK HÄR

Information som hälso- och sjukvårdsteamet ska fylla i

Ge detta kort till CAR-T hälso- och sjukvårdsteamet så att de kan fylla i informationen och ge tillbaka kortet till dig.

DEN (DATUM)

fick denna patient ciltakabtagen-autoleucel som är en chimär antigenreceptor T-cellterapi (CAR-T-cellterapi) för multipelt myelom.

(TILLVERKNINGSSATSNUMMER)

VIK HÄR

Viktig information till vårdgivare

Denna patient har fått en modifierad autolog T-cellsimmun-terapiprodukt som kan leda till svår och till och med dödlig CRS och neurologisk toxicitet. CRS kan uppkomma i alla organsystem. Bedöm patienten för tecken och symtom på CRS och neurologisk toxicitet.

Fullständig information finns i produktresumén.

VIK HÄR

Innan du ger patienten någon behandling, kontakta den primära vårdgivaren på det telefonnummer som anges på framsidan av detta kort. Denna patient ska inte donera blod, organ, vävnader eller celler för transplantation.

Lokal företrädare:
Janssen-Cilag Oy
Tel: + 358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com