

PATIENTKORT

Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar STAYVEER (bosentan)

Detta kort innehåller viktig information om STAYVEER. Vänligen läs detta kort noggrant innan du börjar din behandling med STAYVEER.

Ditt namn: _____

Ordinerande läkare: _____

Om du har frågor om STAYVEER, fråga din läkare.

Janssen-Cilag International NV

Preventivmedel

Använder du preventivmedel för närvarande?

☐ Ja _____ ☐ Nej _____

Om ja, skriv namnen på dem här:

Ta med dig detta kort till din läkare eller din gynekolog vid ditt nästa besök så att han/hon kan ge dig råd om du behöver använda ytterligare eller alternativa preventivmedel.

Om du är en kvinna i fertil ålder ska du läsa denna sida noggrant

Graviditet

STAYVEER kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta STAYVEER om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar STAYVEER.

Dessutom, om du har för högt blodtryck i lungorna, kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom. Om du misstänker att du är gravid ska du tala om detta för din läkare eller gynekolog.

Preventivmedel

Hormonbaserade preventivmedel - såsom p-piller, injicerbara hormoner, implantat eller p-plåster förhindrar inte, på ett tillförlitligt sätt, graviditet hos kvinnor som tar STAYVEER. Du måste också använda en barriärmetod i tillägg - som kondom, pessar eller p-kudde - till alla typer av hormonella preventivmedel. Se till att du diskuterar alla frågor du har med din läkare eller gynekolog – fyll i detaljerna på baksidan av detta kort och ta med dig det till din läkare eller gynekolog vid ditt nästa besök.

Du ska göra ett graviditetstest innan du börjar ta STAYVEER och varje månad under behandlingen även om du inte tror att du är gravid.

Datum för första månatliga graviditetstest: _____

Blodprov för leverfunktion

Vissa patienter som tagit STAYVEER har uppvisat onormala levervärden. Under behandlingen med STAYVEER kommer din läkare se till att regelbundna blodprover tas för att kontrollera förändringar i din leverfunktion.

Kom ihåg att blodprov för leverfunktion skall tas varje månad.

Efter en dosökning, kommer ytterligare ett prov att tas efter 2 veckor.

Datum för det första månatliga blodprovet: _____

Schema för ditt månatliga leverblodprov:

☐ Jan _____ ☐ Maj _____ ☐ Sep _____

☐ Feb _____ ☐ Juni _____ ☐ Okt _____

☐ Mars _____ ☐ Juli _____ ☐ Nov _____

☐ Apr _____ ☐ Aug _____ ☐ Dec _____