

Tärkeitä tietoja Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - valmisteesta koskien ihmisen immuunikatovirus (HIV) - infektioriskin vähentämistä

Tietoja henkilöille, joille on määrätty Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka –valmiste altistusta edeltävään estohoitoon (pre-exposure prophylaxis, PrEP) (lääkäri antaa)

Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi ja sen tulisi täydentää (ei korvata) lääkkevalmisteen mukana toimitettavaa pakkausselostetta.

Täydellinen luettelo haittavaikutuksista ja muut tärkeät tiedot ovat pakkausselosteessa, joka toimitetaan lääkepakkauksen mukana. Jos sinulla on kysyttävää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Mitä PrEP-hoitoon tarkoitettu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabiini/tenofoviiridisoproksiilisuksinaatti) on reseptilääke, joka auttaa vähentämään HIV-1-infektion riskiä aikuisilla, kun sitä käytetään päivittäin yhdessä turvallisten seksikäytäntöjen kanssa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ottamista ja sen aikana HIV-tartuntariskin pienentämiseksi

- **Sinun täytyy olla HIV-negatiivinen, jotta voit aloittaa PrEP-hoidon Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkalla. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka voi auttaa pienentämään HIV-tartunnan riskiä ainoastaan ennen tartunnan saamista. Sinun täytyy käydä HIV-testissä ja varmistaa, ettei sinulla ole HIV-infektiota. Älä ota Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkaa riskin pienentämiseksi, ellei ole varmistanut, että olet HIV-negatiivinen.**
- Kerro lääkärille kaikista flunssan tyyppisistä oireista sekä Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan ottamista edeltävän kuukauden aikana että aina kun käytät Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkaa. Jos olet harrastanut seksiä, jossa on HIV-tartunnan riski, HIV-infektion merkkejä voivat olla:
 - väsymys
 - kuume
 - nivel- tai lihassärky
 - päänsärky
 - oksentelu tai ripuli
 - ihottuma
 - yöhikoilu
 - suurentuneet imusolmukkeet kaulassa tai nivusissa.

Ota Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka joka päivä HIV-infektion riskin pienentämiseksi, ei vain silloin, kun uskot olevasi alttiina HIV-infektioille.

- **Pelkkä Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan ottaminen ei välttämättä estä HIV-tartuntaa. Sinun tulee jatkaa turvallisia seksikäytäntöjä Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon aikana HIV-tartuntariskin pienentämiseksi**
 - Harrasta aina turvaseksiä. Käytä aina kondomia (pois lukien lampaannahasta valmistetut kondomit) välttääksesi kosketusta siemennesteeseen, emättimen eritteiden tai veren kanssa.
 - Älä lainaa henkilökohtaisia tavaroita, joissa voi olla verta tai ruumiinnesteitä, esimerkiksi hammasharjaa tai partateriä.
 - Älä käytä yhteisiä äläkä käytä uudelleen neuloja tai muita välineitä, joilla pistetään tai käytetään lääkkeitä.
- **Huolehdi siitä, että pysyt HIV-negatiivisena ottaessasi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkaa PrEP-hoitona:**
 - Tiedä oma ja kumppaniasi HIV-status
 - Käy säännöllisesti HIV-testissä
 - Käy sukupuolitauteisteissä muiden sukupuoliteitse tarttuvien tautien, esimerkiksi kupan ja tippurin, varalta. Saat helpommin HIV-tartunnan, jos sinulla on tällainen infektio.

- Jos uskot saaneesi HIV-tartunnan, kerro siitä heti lääkärille, joka voi varmistaa lisätesteillä, että et ole saanut tartuntaa.
 - Älä jätä väliin Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -annoksia äläkä lopeta lääkkeen käyttöä. Annosten jättäminen väliin saattaa suurentaa HIV-tartunnan riskiä.
 - Hanki tietoa ja tukea, jotta voit vähentää mahdollisesti riskiä suurentavaa seksuaalikäyttäytymistä
- **Selvitä, onko sinulla hepatiitti B -virus (HBV), ennen kuin alat käyttää Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkaa.** Jos sinulla on HBV, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan ottamisen lopettamisen jälkeen on olemassa vakava akuutin maksatulehduksen riski.

Miten Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka otetaan

- Ota Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
- Ota yksi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tabletti kerran vuorokaudessa. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tulisi ottaa yhdessä ruuan kanssa aina kun mahdollista. Ota Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka joka päivä, ei vain silloin, kun uskot olleesi alttiina HIV-infektioille.
- Älä jätä väliin Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka –annoksia äläkä lopeta lääkkeen käyttöä. Annosten jättäminen väliin saattaa suurentaa HIV-tartunnan riskiä. Jos Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka –annos jää väliin:
 - Jos huomaat unohtaneesi 12 tunnin kuluessa tavallisesta lääkkeenottoajasta, ota tabletti mieluiten ruuan kanssa niin pian kuin mahdollista. Ota sitten seuraava annos tavalliseen aikaan.
 - Jos huomaat unohtaneesi 12 tunnin tai pidemmän ajan kuluttua tavallisesta lääkkeenottoajasta, älä ota unohtunutta annosta. Odota ja ota seuraava annos mieluiten ruuan kanssa tavalliseen aikaan.
- Jos oksennat alle 1 tunnin kuluessa Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan ottamisen jälkeen, ota toinen tabletti. Sinun ei tarvitse ottaa toista tablettia, mikäli oksentaminen tapahtui myöhemmin kuin 1 tunnin kuluttua Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan ottamisesta.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lue lääkepakkauksen pakkausselosteesta mahdollisten haittavaikutusten täydellinen lista.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, kuten uusia tai pahenevia munuais- ja luusto-ongelmia. Kerro välittömästi lääkärille, jos uskot, että sinulla on jokin pakkausselosteessa mainituista vakavista haittavaikutuksista.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta käyttävillä henkilöillä ovat ripuli, oksentelu, pahoinvointi, huimaus, päänsärky, ihottuma ja heikkouden tunne.

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin haittavaikutus, joka on häiritsevää tai joka ei katoa. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä purkki tiiviisti suljettuna.

Voit ilmoittaa kaikista mahdollisista haittavaikutuksista osoitteeseen:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

ja/tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle:

KRKA Finland Oy

Email: info.fi@krka.biz