

GOBIVAZ® (golimumabi)

Potilaskortti

Potilaan nimi:

.....

Lääkärin nimi:

.....

Lääkärin puh. nro:

.....

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen GOBIVAZ-hoidon aloitusta ja sen aikana. Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille. Lue GOBIVAZIN pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

GOBIVAZ-hoito aloitettu:

.....

Nykyinen/viimeisin hoito:

.....

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron. Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonasta:

Menetelmä:

.....

Päiväys:

.....

Tulos:

.....

Menetelmä:

.....

Päiväys:

.....

Tulos:

.....

Varmista, että sinulla on mukanas luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.

Allergiat:

.....

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

.....

Infektiot

Ennen GOBIVAZ-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
- On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot viimeisimmistä seulontakokeista tähän korttiin.
- Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

GOBIVAZ-hoidon aikana

- Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

Raskaus, imetys ja rokotukset

Jos olet saanut GOBIVAZia raskauden aikana tai imetät, on tärkeää kertoa siitä kaikille lastasi hoitaville lääkäreille ennen kuin lapsesi saa rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa eläviä rokotteita, kuten BCG-rokotetta (tuberkuloosin ehkäisyyn), 12 kuukauteen syntymästä tai imetyksen aikana, ellei hoitava lääkäri toisin suosittele.

Pidä tämä kortti mukanas 4 kuukauden ajan viimeisimmän GOBIVAZ-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, 12 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmentyä pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.