



# POTILASOPAS

## PLUVICTO<sup>®</sup> (lutetium (<sup>177</sup>Lu) vipivotiditetraksetaani)

Tässä oppaassa annetaan tietoja PLUVICTO-valmisteesta potilaille, joille on määrätty PLUVICTO-valmistetta, ja heidän avustajilleen.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

- ▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:  
Novartis Sverige AB  
Puh: +46 8 732 32 00

Hyvä potilas,

Sinä ja hoitotiimisi olette päättäneet, että sinulle aloitetaan PLUVICTO-hoito eturauhassyövän hoitoon.

Tässä oppaassa annetaan tietoja PLUVICTO-valmisteesta sekä siitä, mitä sinun on tiedettävä ennen lääkkeen antoa, sen aikana ja sen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä, joihin ei ole vastattu tässä oppaassa, ota yhteyttä terveydenhuollon tiimiisi.

## 1. Mitä PLUVICTO on ja miten se toimii?

PLUVICTO on radioaktiivinen lääke, jota käytetään etenevän kastroaatioresistentin eturauhassyövän hoitoon aikuisilla, joilla syöpä on levinnyt muualle elimistöön (metastaattinen syöpä) ja jota on jo hoidettu muilla syöpähoidoilla.

PLUVICTO-valmistetta käytetään, jos eturauhassyöpäsolujen pinnalla on proteiinia, jota kutsutaan prostataspesifiseksi membraaniantigeeniksi (PSMA). PLUVICTO sitoutuu eturauhassyöpäsolujen pinnalla olevaan PSMA:han. Sitoutumisen jälkeen, PLUVICTO-valmisteen radioaktiivinen aine, lutetium-177, luovuttaa säteilyä, joka aiheuttaa eturauhassyöpäsolujen kuoleman.

Lääkäri tekee kokeita selvittääkseen, esiintyykö PSMA:ta syöpäsolujen pinnalla. Syöpä reagoi todennäköisemmin PLUVICTO-hoitoon, jos testitulokset on positiivinen.

## Kuinka kauan PLUVICTO-hoito kestää?

PLUVICTO-hoitoa annetaan noin kuuden viikon välein enintään kuusi annosta.

## Miten PLUVICTO annetaan?

PLUVICTO annetaan laskimoon.



## 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen PLUVICTO-valmisteen antoa, sen aikana ja sen jälkeen?

### **PLUVICTO-valmisteen käyttö altistaa radioaktiivisuudelle.**


Lääkärisi ja isotooppilääkäri ovat harkinneet, että radiofarmaseuttisesta toimenpiteestä saatava hoidollinen hyöty ylittää säteilyn aiheuttaman riskin.

Koska tämä lääke on radioaktiivinen, sinun on noudatettava alla kuvattuja ohjeita minimoidaksesi säteilyaltistuksen, ellei isotooppilääkäri toisin määrää.


Hoitotiimisi varmistaa, että olet hyvin valmistautunut.



**Ennen PLUVICTO-valmisteen antoa** sinun on juotava runsaasti vettä, jotta pysyt nesteytettynä ja virtsaat mahdollisimman usein ensimmäisten tuntien aikana lääkkeen annon jälkeen.



**Valmistetta annettaessa** sinut pidetään etäällä muista potilaista.




**PLUVICTO-valmisteen annon jälkeen** on juotava runsaasti vettä 2 päivän ajan, jotta pysyt nesteytettynä ja virtsaat mahdollisimman usein radiofarmaseuttisen valmisteen poistumiseksi elimistöstä.

## ERITYISET VAROTOIMET PLUVICTO-VALMISTEEN ANNON JÄLKEEN

Seuraavia yleisiä potilassuosituksia voidaan harkita kansallisten, paikallisten ja laitospotilaisten menettelyjen ja määräysten rinnalla.

### **Kanssakäyminen muiden ihmisten, sekä lasten ja/tai raskaana olevien naisten kanssa**

- Rajoita läheistä kontaktia (alle 1 metri) seuraavasti:
  - muihin ihmisiin 2 päivän ajan.
  - lapseen ja raskaana oleviin naisiin 7 päivän ajan.
- Nuku erillisessä huoneessa:
  - kuin muut 3 päivän ajan.
  - kuin lapset 7 päivän ajan.
  - kuin raskaana olevat naiset 15 päivän ajan.
- Ei seksuaalista kanssakäymistä 7 päivän ajan.
- Älä siitä lasta PLUVICTO-hoidon aikana äläkä 14 viikon ajan viimeisen annoksen jälkeen. Käytä kondomia yhdynnässä tänä aikana.



## ERITYISET VAROTOIMET PLUVICTO-VALMISTEEN ANNON JÄLKEEN (jatkoa)

### WC:n käyttö

Noudata erityisiä varotoimia kontaminaation välttämiseksi 2 päivän ajan annostelun jälkeen:

- Käytä WC:tä istualtaan.
- Käytä WC-paperia aina kun käyt WC:ssä.
- Pese kädet aina huolellisesti WC:n käytön jälkeen.
- Huuhtelee WC-pöntöstä kaikki pyyhepaperit ja/tai WC-paperi välittömästi käytön jälkeen.
- Huuhtelee WC-pöntöstä kaikki paperit ja muut tarvikkeet, jotka sisältävät kehon kuona-aineita kuten verta, virtsaa tai ulostetta. Tuotteet, joita ei voi huuhdella alas WC:stä, kuten siteet, on laitettava erillisiin muovisiin jättepusseihin (jäljempänä olevien jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti).
- Kaikki erityiset lääkintävälineet, jotka voivat kontaminoitua kehon nesteistä (esim. katetripussit, paksusuoliavannepussit, alusastiat, vesisuuttimet), on tyhjennettävä välittömästi WC-pönttöön ja puhdistettava sen jälkeen



## ERITYISET VAROTOIMET PLUVICTO-VALMISTEEN ANNON JÄLKEEN (jatkoa)

### Suihku ja pyykki

- Käy suihkussa päivittäin vähintään 7 päivän ajan lääkkeen annon jälkeen.
- Pese alusvaatteet, pyjamat, lakanat ja muut hikeä, verta tai virtsaa sisältävät vaatteet erillään muista vaatteista vakiopesuohjelmalla. Valkaisuainetta tai ylimääräisiä huuhteluja ei tarvita.

### Avustajat

2-3 päivän ajan annostelun jälkeen:

- Henkilöt, jotka ovat rajoittuneet sänkyyn tai joiden liikkuvuus on heikentynyt, tarvitsevat avustajan apua. Suosittelemme, että avustaja käyttää kertakäyttöisiä käsineitä avustaessaan kylpyhuoneessa.
- Jos avustaja siivoaa oksennusta, verta, virtsaa tai ulostetta, hänen on käytettävä muovikäsineitä. Käsineet on hävitettävä erillisessä muovisessa jättepussissa (katso jäljempänä oleva kohta “Jätteenkäsittelyohjeet”).



## ERITYISET VAROTOIMET PLUVICTO-VALMISTEEN ANNON JÄLKEEN (jatkoa)

### Jätteenkäsittelyohjeet

- Kaikki pois heitettävät tarvikkeet on hävitettävä erillisessä muovisessa jättepussissa, jota käytetään vain tähän tarkoitukseen.
- Pidä muoviset jättepussit erillään muusta kotitalousjätteestä ja poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Sairaalan henkilökunta kertoo, miten ja milloin nämä jättepussit tulee hävittää.

### Sairaalahoito ja päivystys

- Jos jostain syystä tarvitset päivystyksellistä hoitoa tai joudut yllättäen sairaalaan ensimmäisten 7 päivän aikana hoidon jälkeen, ilmoita radioaktiivisen hoidon nimi, päivämäärä ja annos terveydenhuollon ammattilaisille.



## ERITYISET VAROTOIMET PLUVICTO-VALMISTEEN ANNON JÄLKEEN (jatkoa)

### Muut varotoimet

- Isotooppilääkäri kertoo sinulle, jos sinun on ryhdyttävä muihin erityisiin varotoimiin tämän lääkkeen saamisen jälkeen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys isotooppilääkäriin.







**Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan:**

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

**Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan myyntiluvan haltijalle:**

Novartis Finland Oy, Espoo

Puh. 010 6133 200

[www.novartis.fi](http://www.novartis.fi)