

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä potilaskortissa. Voit raportoida haittavaikutukset suoraan myös osoitteeseen:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA
(www-sivusto: www.fimea.fi)

tai Pfizer Oy:lle:
www-sivusto: www.pfizersafetyreporting.com,
puh. (09) 430 040

Fimean hyväksymispäivämäärä: 05/2026
Versio 2.0

POTILAAN JA HOITAVAN LÄÄKÄRIN TIEDOT

Hoitava lääkäri täyttää potilaan tunnistetiedot, hoitoa koskevat tiedot sekä hoitavan lääkärin yhteystiedot.

Pidä tämä kortti aina mukanasasi ja näytä sitä hätätilanteessa hoitohenkilökunnalle.



Potilaan nimi: _____

Hympavzi-hoidon aloituspäivämäärä: _____

Yhteyshenkilö hätätilanteessa: _____

Yhteyshenkilön yhteystiedot
hätätilanteessa: _____

Lääkkeen määränneen lääkärin nimi: _____

Lääkkeen määränneen lääkärin
yhteystiedot: _____

POTILASKORTTI

HYMPAVZI (marstasimabi)

Pidä tämä kortti aina mukanasasi.

NÄYTÄ KORTTI jokaiselle hoitoosi osallistuvalla terveydenhuollon ammattilaiselle ja mahdollisten päivystyskäyntien yhteydessä.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA HYMPAVZI-HOITOA SAAVILLE POTILAILLE

Hympavzi (marstasimabi) on lääke, jota käytetään verenvuotojen estämiseen tai vähentämiseen vähintään 12-vuotiailla, vähintään 35 kg:n painoisilla potilailla, joilla on

- A-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puutos)
 - ja joille ei ole kehittynyt hyytymistekijä VIII:n vasta-aineita ja joiden sairaus on vaikea-asteinen (hyytymistekijä VIII:n pitoisuus veressä on alle 1 %) tai
 - ja joille on kehittynyt hyytymistekijä VIII:n vasta-aineita
- B-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä IX:n puutos)
 - ja joille ei ole kehittynyt hyytymistekijä IX:n vasta-

aineita ja joiden sairaus on vaikea-asteinen (hyytymistekijä IX:n pitoisuus veressä on alle 1 %) tai

- ja joille on kehittynyt hyytymistekijä IX:n vasta-aineita.

Hympavzi tehostaa veren hyytymistä. Hympavzin ja sen kaltaisten lääkkeiden on tiedetty aiheuttaneen verisuoniin veritulppia (trombooseja). Jos veritulppa lähtee liikkeelle, se voi kulkeutua verenkierron mukana ja aiheuttaa tukoksen toiseen verisuoneen (tromboembolinen tapahtuma). Tromboemboliset tapahtumat voivat sijainnista ja vaikeusasteesta riippuen olla henkeä uhkaavia tai johtaa kuolemaan.

Veritulppariski voi olla suurentunut ennen leikkausta, leikkauksen aikana ja sen jälkeen.

POTILAALLE

LOPETA Hympavzin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset mahdollisen veritulpan oireita, mukaan lukien seuraavia haittavaikutuksia:

- turpoamista tai kipua käsivarsissa tai jaloissa
- punoitusta tai värimuutoksia käsivarsissa tai jaloissa
- hengenhahdistusta
- kipua rintakehässä tai yläselässä
- heikotusta

- nopeaa sydämen sykettä
- kasvojen puutumista
- päänsärkyä
- näköhäiriöitä
- silmäkipua tai silmien turpoamista
- veriysköksiä

TÄRKEÄÄ MUISTAA: Jos sinulla on mikä tahansa mainituista oireista, lopeta Hympavzin käyttö ja soita välittömästi lääkärille tai hakeudu päivystykseen! Nämä eivät ole kaikki mahdollisen veritulpan oireet. Kerro lääkärille, jos sinulla on oireita, jotka vaivaavat sinua tai eivät mene ohi. Jos sinulle suunnitellaan kirurgisia toimenpiteitä, muista ilmoittaa lääkärillesi, että käytät Hympavzia.