

EURneffy

(nasal adrenalinspray)

Hur en svår allergisk reaktion identifieras

Använd nässprayen omedelbart vid första tecken på en svår allergisk reaktion efter exponering för ett allergen.

Symtom kan bestå av:

- Klåda i huden
- Upphöjda hudutslag (som nässelutslag)
- Rodnad
- Svullnad i läppar, hals, tunga, händer och fötter
- Väsande/pipande andning
- Heshet
- Andnöd
- Illamående
- Kräkningar
- Magkramper
- Medvetandeförlust
- Oro
- Snabba hjärtslag
- Krampanfall
- Diarré
- Förlorad kontroll av urinblåsan



Tveka INTE att använda eftersom symptomens svårighetsgrad snabbt kan förändras.

Försäkra dig om att du, ditt barn, din familj, vårdgivare, kollegor och lärare vet hur och när nässprayen ska användas.



Förvaring och hantering

Varje nässpray innehåller en engångsdos adrenalin och levereras i en blisterförpackning med bruksanvisning.

Ha alltid med dig 2 nässprayer ifall du behöver ta en andra dos.



Kom ihåg att kontrollera utgångsdatumet regelbundet och skaffa en ny nässpray i god tid.

Vägledning för korrekt användning för patienter & vårdgivare

Den här vägledningen är framtagen för att ge råd om vad du ska göra vid en svår allergisk reaktion eller anafylaxi.


Både patienter och vårdgivare bör bekanta sig med vägledningen för att försäkra sig om att de kan känna igen symtom på en allergisk reaktion och veta hur de säkert och effektivt ska använda nässprayen.



1. Håll


Håll nässprayen såsom visas. Håll nässprayen med tummen mot kolvens bas och ett finger på vardera sidan av munstycket.

*Dra INTE och tryck INTE på kolven.
Testa INTE och spraya INTE i förväg.
Varje nässpray innehåller endast en dos.*



2. Placera

För in nässprayens spets i en näsborre tills fingrarna rör vid näsan. Håll den rakt, riktad mot din panna.



3. Tryck

Tryck upp kolven stadigt tills den snäpper upp och sprayar in i näsborren.

Vinkla INTE nässprayen mot näsans inre eller yttre väggar.

+ Efter användning

Ring omedelbart 112 för noggrann övervakning av den anafylaktiska reaktionen och för eventuell ytterligare behandling. Om du inte kan ringa själv, be någon annan att ringa åt dig.

Vid användning

Om så behövs kan patienten ligga ned med fötterna högt, men sitta upp vid andningssvårigheter. Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge för att förhindra kvävning. Om symtomen inte försvinner bör patienten om möjligt ha en annan person hos sig tills medicinsk hjälp anländer.

Övervaka patientens symtom

Om symtomen fortsätter att förvärras eller återkommer efter cirka 10 minuter, eller vid eventuellt doseringsfel, ge en andra dos med en ny nässpray i SAMMA näsborre som den första dosen.



Vad är EURneffy?

En nasal adrenalinspray för vuxna och barn med en kroppsvikt på 30 kg eller mer för akutbehandling av svåra allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (plötsliga, svåra och ibland livshotande allergiska reaktioner), mot insektsstick eller -bett, födoämnen, läkemedel och andra allergener (ämnen som orsakar allergi) samt idiopatisk anafylaxi (orsaken till anafylaxi är okänd) eller anafylaxi orsakad av fysisk ansträngning.

Utbildningsmaterial, inklusive en kopia av bipacksedel och bruksanvisning, finns tillgängligt online på www.eurneffy.eu

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Lokal representant:
ALK-Abelló Nordic A/S, filial i Finland
Tel: 09 5842 2120
E-mail: infofi@alk.net