

Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Tätä potilasta hoidetaan ZYNYZ®-valmisteella (retifanlimabi), joka voi aiheuttaa immuunivälitteisiä haittavaikutuksia. Niitä voi ilmetä milloin tahansa hoidon aikana tai hoidon jälkeenkin. Arvioi potilaita immuunivälitteisten haittavaikutusten merkkien ja oireiden varalta. Varhainen diagnoosi ja asianmukainen hoito ovat välttämättömiä immuunivälitteisten haittavaikutusten seurausten minimoimiseksi.

Tarkempia ohjeita immuunivälitteisten haittavaikutusten hoitoon löytyy retifanlimabin valmisteyhteenvedosta.

Onkologin tai muun erikoislääkärin konsultaatio voi olla hyödyllistä elinkohtaisten immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa.

© 2025 Incyte Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Fimea on hyväksynyt koulutusmateriaalin 12/2025 (Versio 1.0) Fimean hyväksymässä riskienhallintasuunnitelmassa kuvatun mukaisesti.

Lisätietoja on ZYNYZ-pakkausselosteessa, joka sisältää tietoa potilaalle, ja verkkosivustolla:

www.incyteglobalmedicalinformation.com

Voit myös soittaa Incyte Medical Information maksuttomaan numeroon +800 00027423 tai ottaa yhteyttä osoitteeseen eumedinfo@incyte.com

TÄRKEÄÄ

- Älä yritä hoitaa haittavaikutuksia itse.
- Älä keskeytä ZYNYZ-hoitoa neuvottelematta asiasta lääkärin kanssa.
- Pidä tätä korttia aina mukanas, erityisesti matkoilla, päivystyspoliklinikkakäynneillä ja toisen lääkärin vastaanotolla.
- Pidä tätä korttia mukanas vähintään 4 kuukautta viimeisen retifanlimabiannoksen ottamisesta.
- Jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai hoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä kortissa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Fimea osoitteessa www.fimea.fi. Haittavaikutuksista ilmoittaminen voi auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Potilaskortti

ZYNYZ® (retifanlimabi)

Tärkeitä turvallisuustietoja immuunivälitteisten haittavaikutusten riskin minimoimiseksi

Zynyz voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat olla joskus hengenvaarallisia ja johtaa kuolemaan. Haittavaikutukset voivat ilmetä koska tahansa hoidon aikana tai jopa hoidon päättymisen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmetä samanaikaisesti useampia.

Ota välittömästi yhteyttä sinua hoitavaan erikoislääkəriin, jos sinulle ilmaantuu tässä kortissa lueteltuja tai muita merkkejä ja oireita. Lääkäri voi antaa muita lääkkeitä vakavampien komplikaatioiden estämiseksi ja oireiden vähentämiseksi. Lääkäri voi peruuttaa seuraavan ZYNYZ-annoksen tai lopettaa hoidon.

▼ **Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.**

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

Keuhkot

- Hengitysvaikeudet
- Uusi tai paheneva yskä
- Rintakipu

Suolisto

- Tiheä ripuli, jossa esiintyy usein verta ja/tai limaa
- Tavanomaista enemmän ulostamista
- Verinen, musta tai tervamainen uloste
- Vaikea vatsakipu tai vatsan aristus
- Pahoinvointi tai oksentelu

Maksa

- Ruokahaluttomuus
- Jatkuva pahoinvointi tai oksentelu
- Kipu vatsan oikealla puolella
- Silmien ja/tai ihon kellastuminen
- Uneliaisuus
- Tummanvärinen virtsa
- Verenvuoto- tai mustelmaherkkyys

Munuaiset

- Alentunut virtsan määrä
- Vaahtoava virtsa
- Veren tai verijäämien esiintyminen virtsassa, jolloin sen väri voi muuttua
- Turvonneet nilkat
- Ruokahaluttomuus

Umpirauhaset

- Nopea syke
- Huimaus tai pyörtyminen
- Äärimmäinen väsymys
- Jatkuva tai epätavanomainen päänsärky
- Painonmuutokset
- Palelu
- Hiustenlähtö
- Ummetus

Tyyppin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi

- Normaalia suurempi nälän tai janon tunne
- Tiheävirtsaisuus
- Painon lasku
- Väsymyksen tai sairauden tunne
- Vaikeus ajatella selkeästi
- Nopea ja syvä hengitys
- Hengityksen makea tai hedelmäinen haju
- Makea tai metallinen maku suussa
- Vatsakipu
- Uneliaisuus
- Virtsan tai hien poikkeava haju

Iho

- Ihottuma tai kutina
- Rakkuloita tai haavaumia suussa tai nenän, kurkun tai sukupuolielinten limakalvolla

Muut elimet

- Näön muutokset
- Nivelten, lihasten, hermojen, haiman tai sydänlihaksen tulehdus

Tärkeitä yhteystietoja

Erikoislääkärin nimi

Työpuhelinnumero

Puhelinnumero työajan ulkopuolella

Oma nimi

Oma puhelinnumero

Hätäyhteyshenkilö (nimi)

Hätäyhteyshenkilö (puhelinnumero)