PENTHROX®
(metoxifluran)

Läkemedelssäkerhetsinformation

Checklista för administrering

Denna checklista är nödvändig för att säkerställa säker och effektiv användning av metoxifluran och lämplig hantering av viktiga utvalda risker.

VIKTIG INFORMATION FÖR RISKMINIMISERING FÖR VÅRDPERSONAL INOM AKUTSJUKVÅRD

Innan användning av metoxifluran kontrollera att patienten inte har:

Kardiovaskulär instabilitet
Överkänslighet mot metoxifluran, fluorerade anestetika eller mot något hjälpämne
Känd eller genetiskt misstänkt känslighet mot malign hypertermi, patienter med en anamnes på eller patienter med en känd familjeanamnes på allvarliga biverkningar efter administrering av inhalerade anestetika
Reducerad medvetandegrad (inklusive orsakad av alkohol)
Nedsatt njurfunktion

Kontrollera också:

Ålder under 6 år
Andningsdepression
Nedsatt leverfunktion
Senaste administreringen av metoxifluran

Om patienten lider av några av ovan listade tillstånd eller tar några av läkemedlen listade på baksidan, ge **INTE** metoxifluran.

Instruera patienten hur man korrekt administrerar metoxifluran.

Påminnelse: Läs produktinformationen innan administrering och ge bipacksedeln till patienten och vårdnadshavare. Säkerställ att lägsta nödvändiga dos administreras och att maxdosen 6 ml (2 x 3 ml flaskor per dygn) inte överskrids.

Patienten inte tar:

CYP 450 enzyminducerare (t.ex alkohol, isoniazid, fenobarbital, rifampicin karbamazepin, efavirenz eller nevirapin.) Antibiotika med känd nefrotoxisk effekt (t.ex tetracyklin, gentamicin, kolistin, polymyxin B eller amfotericin B).

Samtidig användning av metoxifluran och CNS-depressiva medel kan framkalla additiva hämmande effekter och patienter bör observeras noggrant.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till. Fimea, webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Godkänd av Fimea: maj 2026 Utarbetats: maj 2026 MAT-PEN-FI-000088