POTILASKORTTI

Apixaban Orion
(apixabaani)

- **Sinun/lapsen/hoitajan on pidettävä tämä kortti aina mukana**

Sinun/lapsen/hoitajan on pidettävä tämä kortti aina mukana.

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle, hammaslääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle ennen hoitoa.

Saan verenhyytymistä estävää Apixaban Orion -hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi.

TIETOA POTILAILLE/HOITAJILLE

- Ota/anna Apixaban Orion säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat aamuannoksen, ota/anna se heti kun muistat. Se voidaan ottaa/antaa yhdessä ilta-annoksen kanssa. Unohtuneen ilta-annoksen saa ottaa/antaa vain samana iltana. Älä ota/anna seuraavana aamuna kahta annosta, vaan jatka seuraavana päivänä hoitoa suositellun tavanomaisen aikataulun mukaan kahdesti vuorokaudessa.
- Älä lopeta Apixaban Orion -lääkkeen ottamista/antamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä sinulla/potilaalla on riski saada aivohalvaus/verihyytymä tai muita komplikaatioita.
- Apixaban Orion auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiäsi.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksennus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, **hakeudu heti hoitoon**.
- Jos tarvitset/potilas tarvitsee leikkaushoitoa tai sinulle/potilaalle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärille, että käytät/potilas käyttää Apixaban Orion -lääkettä.

TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Apixaban Orion (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.
- Apixaban Orion saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Apixaban Orion -hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, antifaktori Xa-määrityksestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) – katso valmisteyhteenveto.
- Apiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine aikuisille. Sen turvallisuutta ja tehoa ei ole kuitenkaan varmistettu pediatrisilla potilailla (ks. andeksaneetti alfan valmisteyhteenveto).

OLE HYVÄ JA TÄYTÄ TÄMÄ OSIO ITSE TAI PYYDÄ LÄÄKÄRIÄ TEKEMÄÄN SE

_____
Potilaan nimi

_____
Syntymäaika

_____
Käyttöaihe

Paino _____kg

Annos _____mg kahdesti vuorokaudessa

_____
Lääkärin nimi

_____
Lääkärin puhelinnumero