# PATIENTKORT

## Apixaban Orion
(apixaban)

- **Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren**

Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren.

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdpersonal som före behandling.

**Jag behandlas med Apixaban Orion (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar.**

### INFORMATION TILL PATIENTERN/ VÅRDNADSHAVARE

- Ta/ge Apixaban Orion regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas/ges tillsammans med kvällsdosen. En missad kvällsdos kan bara tas/ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa doseringsschemat två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta/ge Apixaban Orion utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke, blodpropp eller andra komplikationer.
- Apixaban Orion hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart**.
- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder Apixaban Orion.

### INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL

- Apixaban Orion (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Orion kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixaban-behandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Orion kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av apixabans anti-faktor Xa-aktivitet finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts för pediatriska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).

### VÄNLIGEN FYLL I DETTA AVSNITT ELLER BE LÄKAREN ATT GÖRA DET

_____
Namn

_____
Födelsedatum

_____
Indikation

Vikt _____ kg

Dos _____ mg två gånger dagligen

_____
Läkarens namn

_____
Läkarens telefonnummer