

DUODOPA®-HOIDON YLLÄPITO

Tämä kysymyslista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan. Potilaiden olisi hyvä seurata oireitaan ja kirjata niitä ylös 2–3 päivän ajan ennen vastaanottokäyntiä tai sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Potilaiden tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti, joten seuranta-aikataulu ja kysymykset on sovitettava kunkin potilaan tilanteeseen.

| Kotiutuksesta kulunut aika | Soitto | Vastaanottokäynti |
|----------------------------|--------|-------------------|
| Yksi viikko | ✓ | |
| Yksi kuukausi | | ✓ |
| Kolme kuukautta | | ✓ |
| Kuusi kuukautta | | ✓ |

LAITTEEN JA LETKUJEN KÄSITTELY

| Laite | 1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | Huomioitavaa |
|--|-------|------|------|------|--------------|
| Osaatko käynnistää ja sammuttaa laitteen ja ottaa tarvittaessa lisäannoksen? | | | | | |
| Osaatko yhdistää lääkekasetin laitteeseen ja liittää sen PEG/J-letkuun? | | | | | |
| Onko laitteessa ollut hälytyksiä? | | | | | |
| Oletko vaihtanut laitteeseen paristot? | | | | | |
| Letkut | | | | | |
| Pystytkö huuhtelemaan sisäletkun ja sivuhaaran? | | | | | |
| Ovatko PEG/J-letku ja liittimet kunnossa? | | | | | |

Lisätietoja latteen käytöstä ja tavallisimmista hälytyksistä löydät Hoitajaoppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

ANNOSTEN VAIKUTUS

| Päivä | 1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | Huomioitavaa |
|--|-------|------|------|------|--------------|
| Miten aamuannos vaikuttaa? | | | | | |
| Miten lisäannokset vaikuttavat? | | | | | |
| Miten jatkuva infuusio toimii päivän aikana? | | | | | |
| Montako lisäannosta tarvitset päivässä? | | | | | |
| Yö | | | | | |
| Miten yösi sujuvat? | | | | | |
| Otatko tablettimuotoisia Parkinson lääkkeitä iltaisin tai öisin? | | | | | |
| Onko sinulla painajaisia / vilkkaita unia? | | | | | |

| Annosten hallinta | 1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | Huomioitavaa |
|--|-------|------|------|------|--------------|
| Oletko muuttanut jotakin annosta – aamu-annosta, jatkuvaa infuusiota tai lisäannosta? | | | | | |
| Jos olet, mitä annoksia ja miten usein? | | | | | |
| Käytätkö muita Parkinson lääkkeitä Duodopan lisäksi? | | | | | |
| Sosiaalinen elämä ja mieliala | | | | | |
| Kerro sosiaalisesta elämästäsi. | | | | | |
| Onko toimintakykysi muuttunut? Pystytkö nyt tekemään asioita, jotka eivät aiemmin onnistuneet? | | | | | |
| Millainen on mielialasi? | | | | | |

Lisätietoja annosten muuttamisesta löydät Hoitajaoppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

AVANTEEN HOITO JA KANTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

| Avanne | 1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | Huomioitavaa |
|--|-------|------|------|------|--------------|
| Miltä avanne näyttää? | | | | | |
| Onko se puhdas? | | | | | |
| Onko se kuiva? | | | | | |
| Onko punoitusta, turvotusta tai onko se ärtynyt? | | | | | |
| Onko sinulla vatsakipua? | | | | | |
| Kantovälineet | | | | | |
| Mitä kantovälineitä käytät? | | | | | |
| Ovatko kantovälineet sopivia ja käytännöllisiä? | | | | | |
| Tiedätkö, mistä saat tilattua kantovälineitä? | | | | | |
| Muuta | | | | | |
| Oletko hakenut hoitotarvikejakelusta tarvikkeita? | | | | | |
| Onko sinulla lääkärin antama todistus hoidosta (Treatment Certificate)? | | | | | |
| Tiedätkö, mihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai ongelmia hoidon suhteen? | | | | | |

Lisätietoja avanteen ja PEG/J-letkun hoidosta löydät Hoitajaoppaasta 3 Duodopa-hoidon aloitus.

Lisätietoja kantovälineistä löydät Hoitajaoppaasta 2 Elämää Duodopan kanssa.

Duodopa on tarkoitettu pitkälle edenneen levodopaan reagoivan Parkinsonin taudin hoitoon, johon liittyy vaikeita motorisia tilanvaihteluja ja hyper-/dyskinesiaa, eivätkä saatavilla olevat Parkinsonin taudin lääkkeiden yhdistelmät tuota tyydyttäviä tuloksia. Duodopa on geeli, joka annostellaan jatkuvana infuusiona laitteen (CADD-Legacy 1400 pumppu) ja letkujen kautta ohutsuoleen.

AbbVie Oy

Pihatörmä 1B, 02240 Espoo, Suomi.

Duodopa®-hoidon ylläpito

FIDUO140031(1)/RMP/03.05.2017

Copyright © 2017 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.