

# LITALGIN®-VALMISTEEN POTILASKORTTI

## VAKAVIEN HAITTOJEN RISKIN MINIMOIMISEKSI

Tutustu huolellisesti tähän potilaskorttiin ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste ennen Litalgin-valmisteen käyttöä.

### HYVÄKSYTYT KÄYTTÖAIHEET

Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain sen hyväksytyihin käyttöaiheisiin, jotka ovat

- Ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden koliikkikiput
- Rakkokouristukset.

Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain lääkärin ohjeen mukaisesti. Älä käytä Litalgin-valmistetta omatoimisesti muihin oireisiin.

### LITALGIN®-VALMISTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA

- Litalgin-valmisteen käyttöön voi liittyä harvinaisena vakavana haittavaikutuksena luuytimen toiminnan häiriö ja merkittävä veren valkosolujen määrän väheneminen (agranulosytoosi). Valkosolut taistelevat infektioita vastaan ja valkosolujen määrän vähenemisen oireita voivat olla kurkkukipu, selittämätön kuumeilu, suun limakalvojen tulehdukset, nivelvaivat, sekä muut infektion oireet.
  - Veren valkosolujen määrän vähenemistä voi seurata vakava tulehdus, joka voi johtaa kuolemaan.
- Valkosolujen vähenemisen riskin vuoksi on tärkeää, että Litalgin-valmistetta käytetään vain lyhyimmän tarvittavan ajan. Jos käytät Litalgin-valmistetta yli viikon ajan, tulee sinun käydä viikoittain verikokeissa lääkärin ohjeen mukaan veren valkosoluarvojen tarkistamiseksi.
- Raportoiduissa valkosolujen vähenemistapauksissa potilaat olivat altistuneet Litalgin-valmisteelle vaihtelevan ajan (1 vrk – lähes 2 vuotta), joten riski pitää huomioida koko Litalgin-hoidon ajan.
- Mikäli tulehduksen oireita ilmenee, tulee Litalgin-valmisteen käyttö lopettaa välittömästi ja sinun tai hoitoosi osallistuvan henkilön tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.
- Älä koskaan käytä Litalgin-valmistetta, jos aikaisempaan Litalgin-hoitoosi on liittynyt luuytimen toiminnan heikkeneminen.

Saat tietoa Litalgin-valmisteesta myös täältä:

Takeda Oy, puh: 020 746 5000, s-posti: infoposti@takeda.com

Tämän materiaalin on laatinut:

Takeda Oy

