

PATIENTKORT FÖR LITALGIN®

Bekanta dig noggrant med detta patientkort och läs bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du använder Litalgin.

GODKÄNDA INDIKATIONER

Litalgin skall användas bara för dess godkända indikationer, som är

- koliksmärta i matsmältningskanalen och i gall- och urinvägarna
- blåskramper.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV LITALGIN®

- Användning av Litalgin kan vara förknippad med följande sällsynta biverkningar:
 - funktionsstörning i benmärgen och betydande minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos). Symptom på den kan vara oförklarlig feber, infektioner av slemhinnor i munnen samt ledbesvär.
 - akut överkänslighetsreaktion (anafylaktisk reaktion), och symptom på den kan vara andningsvärigheter, svullnad, hudrodnad, generell klåda, svullnad i svalget eller struphuvudet, svindel och illamående.
- Om symptom på agranulocytos och anafylaktisk reaktion förekommer, skall du sluta använda Litalgin omedelbart och du eller en person som deltar i din behandling skall kontakta läkare, sjukhuset eller akutmottagning.
- På grund av risken för agranulocytos får Litalgin bara användas under kortast möjliga tid.
- Om du använder Litalgin längre än en vecka, skall du ha dina blodvärden (vita blodkroppar) kontrollerade varje vecka enligt läkarens instruktioner.

För att få ytterligare information om Litalgin kontakta:
Takeda Oy, tfn: 020 746 5000, e-post: infoposti@takeda.com

Detta material är utarbetat av:
Takeda Oy

