Tolvaptan

Patientguide

Innehåll

1. Vad är syftet med den här guiden? 5

2. Vad är tolvaptan? 5

3. Vilka patienter är inte lämpliga för behandling med tolvaptan? 6

4. Vilka patienter bör vara särskilt försiktiga när de tar tolvaptan? 6

5. Vilka är några av de viktiga biverkningar av tolvaptan som jag bör känna till? 7

6. Det är viktigt att dricka mycket med vätska när du tar tolvaptan 8

7. Är det säkert att ta tolvaptan medan jag försöker bli gravid, under graviditet eller medan jag ammar? 9

8. Vad är tolvaptan-patientkort och hur ska jag använda det? 9

1. Vad är syftet med den här guiden?

Den här patientguiden tillhandahålls av Otsuka Pharma Scandinavia AB för patienter med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) som behandlas med tolvaptan.

I den här guiden:

- får du en förklaring av vad tolvaptan är, vilket medicinskt tillstånd det används för och hur det ska användas
- får du viktig säkerhets-information, speciellt angående riskerna för leverbiverkning och vatten-förlust och hur man kan hantera detta
- får du information om vikten av att använda preventivmedel under behandling med tolvaptan.

Viktigt: Läs ”Bipacksedeln: Information till patienten” (hittas i läkemedelsförpackningen) som innehåller den fullständiga informationen, inklusive information om andra försiktighetsåtergärder som du behöver känna till när du behandlas med tolvaptan. Prata med din läkare om du har frågor om behandlingen med tolvaptan.

2. Vad är tolvaptan?

Du har fått förskrivet tolvaptan eftersom du har autosomal dominant polycystisk njursjukdom eller ”ADPKD”.

Vid ADPKD är njuren alltför känslig för ett hormon som finns naturligt i kroppen och kallas vasopressin. Tolvaptan innehåller den aktiva substansen tolvaptan som blockerar denna effekt och kan bromsa tillväxten av njurcystor. Tolvaptan gör även att produktionen av urin ökar.

3. Vilka patienter är inte lämpliga för behandling med tolvaptan?

Din läkare kommer att besluta om det är lämpligt att du behandlas med tolvaptan.

På grund av några risker associerade med behandling med tolvaptan, såsom möjliga effekter som kan göra så att din lever inte fungerar som den ska, samt risken för uttorkning, bör du inte behandlas med tolvaptan om något av följande gäller dig:

- Om du har fått veta att du har förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet vilket gör att du inte bör behandlas med tolvaptan
- Om du inte kan eller inte vill genomgå lever-funktionstester varje månad
- Om du har ett tillstånd som är förenat med en mycket låg blodvolym
- Om du har svårt att känna när du är törstig eller om du inte kan dricka tillräckligt med vatten

Undvik behandling med tolvaptan om du är kvinna och planerar att bli gravid, är gravid eller ammar.

4. Vilka patienter bör vara särskilt försiktiga när de tar tolvaptan?

Du som behandlas med tolvaptan bör vara försiktig och tala om för läkaren:

- Om du lider av en leversjukdom, eller annat medicinskt tillstånd eller sjukdom
- Om du inte kan dricka tillräckligt mycket med vatten eller om du måste begränsa ditt vätskeintag
- Om du är osäker på om behandling med tolvaptan är lämpligt för dig

5. Vilka är några av de viktiga biverkningar av tolvaptan som jag bör känna till?

Tolvaptan kan påverka hur levern fungerar och höja nivånerna av leverenzymer och bilirubin i blodet.

Du kan behöva ta ytterligare blodprover. Behandling med tolvaptan kommer att avbrytas och kan påbörjas igen om blodproverna för leverfunktionen är normala.

Läkaren kommer att ta blodprov för att se om leverfunktionen är förändrad:

- innan behandlingen med tolvaptan inleds
- varje månad under de första 18 behandlingsmånaderna
- var tredje månad efter 18 månader.

Följande symtom tyder på att du kan ha leverproblem:

- trötthet
- förlorad aptit
- smärta i buken
- mörk urin
- gul hud eller gula ögon (gulsot)
- svår uttorkning
- illamående
- kräkning
- klåda
- influensaliknande syndrom (led- och muskelvärk med feber)
- feber.

Det är viktigt att du kontaktar din läkare om du utvecklar något av de ovannämnda symtomen.

6. Det är viktigt att dricka mycket med vätska när du tar tolvaptan

Tolvaptan orsakar vattenförlust eftersom det ökar din urinproduktion.

Vattenförlusten kan leda till biverkningar som muntorrhet och törst eller till och med mer allvarliga biverkningar som njurproblem eller svår uttorkning.

Symtom på uttorkning kan inkludera:

- ökad törst
- muntorrhet
- allmän svaghet eller sömnproblem
- minskad urinering
- huvudvärk
- torr hud
- yrsel
- kraftiga hjärtslag
- förvirring
- försämrad hudelasticitet

Det är viktigt att du kontakter din läkare om du utvecklar något av de ovannämnda symtomen.

Tolvaptan gör att du behöver urinera oftare än förut och det kan göra dig törstigare än vanligt. Du bör dricka mycket vatten eller andra vattenbaserade drycker oavsett om du är törstig eller inte, för att undvika intensiv törst eller uttorkning. Du bör dricka 1–2 glas vätska före sängdags och du bör dricka mer om du urinerar under natten. Du måste vara särskilt försiktig om du har sjukdomar som ökar risken för vattenförlust, t.ex. om du kräks eller har diarré.

7. Är det säkert att ta tolvaptan medan jag försöker bli gravid, under graviditet eller medan jag ammar?

Du ska inte ta tolvaptan om du försöker bli gravid eller medan du är gravid eftersom det kan leda till biverkningar hos dig och onormal utveckling hos ditt ofödda barn.

Fertila kvinnor måste använda en effektiv och pålitlig preventiv-metod i minst fyra veckor före behandling, under behandling och även vid dosavbrott, och i minst fyra veckor till efter det att de har slutat ta tolvaptan. Du bör diskutera användningen av preventivmedel som innehåller östrogen med läkaren eftersom östrogen kan öka tillväxt och utveckling av levercystor.
Du ska inte amma medan du tar tolvaptan. Om du blir gravid, sluta ta tolvaptan och informera din förskrivande läkare omedelbart så att din graviditet kan övervakas

8. Vad är tolvaptan-patientkort och hur ska jag använda det?

När du förskrivs tolvaptan första gången får du ett tolvaptan-patientkort av din läkare eller sköterska.

Kortet innehåller viktig säkerhetsinformation om riskerna för leverskada och uttorkning medan man tar tolvaptan och vad man ska göra om tecken eller symtom uppkommer. På kortet finns även kontaktuppgifter till din läkare och klinik som ska användas i nödfall. Kontaktuppgifterna skrivs in på kortet av vårdgivaren. Du ska alltid ha kortet med dig i din plånbok eller väska om en akut situation uppstår.

Om du inte har fått något patientkort ska du kontakta din läkare eller sköterska.

Patientguide

Tillhandahållen av:
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Sverige
www.otsuka.fi

Tidpunkt för färdigställande:06/2026, Godkänt 25.06.2026 (FIMEA)
Jobbkod: PASS update JIN_Patient material_Finland in Swedish_Final_Ver5.0_Apr2026