

Ha alltid detta kort med dig.
Säkerhetsinformation till patienter.

Patientkort

Viktig säkerhetsinformation för akuvårdspersonal

Jinarc® kan orsaka leverskada. Leverfunktionstester måste utföras regelbundet (varje månad de första 18 månaderna, sedan var 3:e månad). Vid tecken på leverskada eller onormal förhöjning av ALAT och ASAT ska behandling med Jinarc omedelbart avslutas.

Jinarc® blockerar verkan av vasopressin i njuren och vilket leder till en ökad urinering och kan leda till svår uttorkning. Symptom av uttorkning kan omfatta ökad törst, muntorrhet, trötthet, minskad urinproduktion, huvudvärk, torr hud, yrsel, ökad hjärtrytm och förvirring.

Det finns mer information på www.fass.se.

Patientens namn:

Datum då Jinarc® förskrevs första gången:

Läkarens namn:

Sjukhus respektive klinikens namn:

Kontaktnummer till kliniken:

Viktig säkerhetsinformation för patienter

Jinarc® kan påverka hur levern fungerar.

Vänd dig till din läkare om du får symptom som trötthet, förlorad aptit, smärta i buken, feber, mörk urin, gul hud/gula ögon (gulsot), svår uttorkning, illamående, kräkning, klåda eller led- och muskelsmärta med feber.

Jinarc® kan orsaka svår uttorkning.

Drick mycket vätska för att undvika uttorkning och vänd dig till din läkare om du inte kan dricka vätska.