



Potilaan tiedot

Sukunimi

Etunimi

Puhelin

Yhteystiedot hätätilanteessa

Sukunimi

Etunimi

Puhelin

Lääkärin yhteystiedot

Lääkärin sukunimi

Puhelin

Osoite

Potilaskortti

BCG-medac

(BCG – Bacillus Calmette Guérin)

: medac

TÄRKEÄÄ TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Tämä potilas saa / on saanut BCG-medac-hoitoa rakkosyöpään. BCG-medac voi aiheuttaa systeemisiä infektioita, jotka voivat johtaa kuolemaan, jos niitä ei hoideta asianmukaisella tavalla.

BCG sisältää lyofilisoidussa suspensiossa eläviä, heikennettyjä *Mycobacterium bovis*- kannasta johdettuja Bacillus Calmette-Guérin -bakteereja, joilla on alhainen taudinaiheuttamiskyky. Tämä linja ei ole virulentti. Sen vuoksi potilasta ei tarvitse eristää.

Systeemiset BCG-infektiot voivat ilmetä jopa vuosia sen jälkeen, kun viimeinen annos on annettu rakonsisäisenä instillaationa. Nämä infektiot voivat ilmetä kuumeena, yöhikoiluna, laihtumisena, keuhkojen tai maksan granuloomana, sidekalvontulehduksena tai Reiterin oireyhtymänä, absesseina, infektoituneina aneurysmina tai implantin tai siirteen infektiona, joka voi olla levinnyt myös ympäröiviin kudoksiin. Varhainen diagnoosi ja asianmukainen hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä infektion mahdollisten jälkiseurausten minimoinnissa.

Huomaa, että negatiivinen tulos mykobakteeritestistä ei sulje pois systeemistä BCG-infektiota käytetystä näytteestä riippumatta (veri, virtsa, seerumi). On raportoitu useita tapauksia, joissa veri/virtsaviljely on ollut negatiivinen, vaikka potilaalla oli systeeminen BCG-infektio.

Epäillyn BCG-infektion hoito riippuu kliinisten oireiden luonteesta ja vaikeusasteesta.

Ilmoita epäillyistä haittavaikutuksista. Maakohtaiset yhteystiedot löytyvät asiakirjan kääntöpuolelta.

Lisätietoa on saatavana valmisteyhteenvedossa.

On suositeltavaa konsultoida infektiosairauksiin erikoistunutta lääkäriä.

TÄRKEÄÄ

Tässä kortissa on tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa, josta sinun on oltava tietoinen BCG-medac-hoidon aikana ja sen jälkeen. Pidä tämä kortti aina mukana lompakossa ja näytä se sinua hoitavan urologian erikoislääkärin lisäksi kaikille sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Pidä kortti helposti saatavilla myös sen jälkeen, kun BCG-medac-hoito on päättynyt!

BCG-medacin haittavaikutukset voivat ilmetä milloin tahansa hoidon aikana ja jopa vuosia hoidon päättymisen jälkeen. Haittavaikutukset ovat hoidettavissa, kun ne on diagnosoitu.

Kerro myös lääkärille, jos sinulla ilmenee mitä tahansa muita sinua huolestuttavia, epäilyttäviä oireita, joita ei ole lueteltu tässä kortissa.

Älä yritä hoitaa oireitasi itse muilla lääkkeillä.

BCG-medac-hoito saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena systeemisen infektion. Tämä infektio voi kehittyä milloin tahansa – jopa vuosia viimeisestä lääkkeenannosta. Se on kuitenkin hoidettavissa, kun se on diagnosoitu.

Niin kutsutun viivästyneen BCG-infektion merkkejä ja oireita on joskus vaikea tunnistaa, koska ne muistuttavat muita sairauksia.

Näitä rakon ulkopuolisen BCG-infektion merkkejä ja oireita voi olla

- Yli 39,5 °C:n kuume vähintään 12 tunnin ajan tai yli 38 °C:n kuume, joka kestää viikkoja; yöhikoilu
- Laihtuminen tuntemattomasta syystä
- Voimistuva huonovointisuus
- Inflammaation eli tulehduksen merkit voivat vaihdella ja ilmetä
 - hengitysvaikeuksina tai yskänä, jotka eivät tunnu samalta kuin tavallisessa nuhakuumeessa

- maksaoireina: paineen tunne ylävatsan oikealla puolella tai maksan toimintakokeiden poikkeamat (erityisesti entsyymissä nimeltään alkalinen fosfataasi), tai
- silmän kipuna ja punoituksena, näköongelmina tai näön sumentumisena; silmän sidekalvotulehdus
- Niin kutsuttu granulomatoottinen inflammaatio, joka todetaan koepalasta.

Jos sinulla ilmenee kaksi tai useampi edellä luetelluista haittavaikutuksista, hakeudu sairaalaan, lääkäriin tai urologisi vastaanotolle, vaikka rakkosyöpäsi olisikin hoidettu jo kauan sitten.

- Ota mukaan sairaalaan tämä kortti ja täydellinen lista lääkkeistäsi, niin reseptilääkkeistä kuin käsikauppalääkkeistä, vitamiineista ja luontaistuotteista.
- Kerro lääkäreille ja/tai sairaanhoitajille, että saat / olet saanut BCG-hoitoa ja näytä heille tämä kortti. Näin he tietävät, millaista hoitoa tarvitset.

Lisätietoa on saatavana pakkausselosteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, on oleellisen tärkeää, että keskustele niistä lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. Voit lisäksi ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea