

Tietoa potilaille OLUMIANT[®]-lääkkeestä (barisitinibi)

Tässä potilaskortissa on tärkeää turvallisuustietoa, johon sinun on tutustuttava ennen Olumiant-hoidon aloittamista ja pidettävä mielessä hoidon aikana.

Pidä potilaskortti mukanasasi ja näytä sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Nimesi:

Olumiant-lääkkeen määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55, FI-00034 FIMEA

tai myyntiluvanhaltijalle:

Oy Eli Lilly Finland Ab,
medinfo_finland@lilly.com,

puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)

Raskaus

- Älä käytä Olumiant-lääkettä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.
- Käytä tehokasta ehkäisyä Olumiant-hoidon aikana (ja 1 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen).
- Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi (tai suunnittelet raskautta).

Infektiot

Olumiant voi pahentaa olemassa olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion saamisen tai virusten uudelleen aktivoitumisen mahdollisuutta. Jos sinulla on diabetes tai olet yli 65-vuotias, sinulla voi olla lisääntynyt mahdollisuus saada infektioita. Infektio voi muuttua vakavaksi, jos sitä ei hoideta. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on infektioiden oireita, esim. seuraavia:

- Kuumetta, haavoja, tavallista voimakkaampaa väsymystä tai hammasvaivoja.
- Pitkittyvää yskää, yöhikoilua ja painon laskua. Ne voivat olla tuberkuloosin (keuhkojen infektiotaudin) merkkejä.
- Kivuliasta, rakkulaista ihottumaa. Se voi olla vyöruusun merkki.

Ei-melanoottinen ihosyöpä

Ei-melanoottisia ihosyöpiä on havaittu Olumiant-valmistetta käyttävillä potilailla. Kerro lääkärillesi, jos uusia ihovaurioita ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen tai jos olemassa olevien ihovaurioiden ulkonäkö muuttuu.

Veritulpat

Olumiant voi aiheuttaa tilan, jossa alaraajaan muodostuu veritulppa, joka voi kulkeutua keuhkoihin. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

- turvotusta tai kipua toisessa jalassa tai käsivarressa
- kuumotusta tai punoitusta toisessa jalassa tai käsivarressa
- odottamatonta hengästymistä
- nopeaa hengitystä
- rintakipua.

Sydänkohtaus tai aivohalvaus

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla on jokin seuraavista:

- vaikea rintakipu tai puristava tunne (joka voi levitä käsivarsiin, leukaan, kaulaan, selkään)
- hengenahdistus
- kylmä hiki
- yksipuolinen heikkous kädessä ja/tai jalassa
- sammaltava puhe.

Fimean hyväksymä 27.3.2023

V4.0 EU_PACadditionalriskminclean