

Oppaasi Beovu[®] -hoitoon (brolusitsumabi)

Mikä on neovaskulaarinen (kosteaa) silmänpohjan ikärappeuma (AMD)?

Silmänpohjan ikärappeuman kosteasta muodosta on kyse, kun silmän makulan alle muodostuu ja kasvaa poikkeavia verisuonia. Silmän takaosassa sijaitseva makula on silmän tarkan näkemisen alue. Poikkeavista verisuonista voi tihkua nestettä tai verta silmään, mikä voi häiritä makulan toimintaa ja johtaa näkökyvyn heikkenemiseen.

Miksi minulle on määrätty Beovu-valmistetta?

Beovun sisältämä vaikuttava aine brolusitsumabi kuuluu uudissuonittumisen estoon käytettävien lääkkeiden ryhmään. Lääkäri hoitaa aikuisten silmänpohjan ikärappeuman kosteaa muotoa antamalla Beovu-valmistetta pistoksena silmän lasiaiseen.

Silmässä verisuonten kasvua aiheuttaa verisuonten endoteelinen kasvutekijä A -niminen aine eli VEGF-A. Beovu kiinnittyy VEGF-A:han ja estää sitä toimimasta sekä vähentää poikkeavien verisuonten kasvua silmänpohjan ikärappeuman kosteassa muodossa. Tämä puolestaan vähentää nesteen tai veren tihkumista silmään.

Hoidon jälkeen

- Lääkäri tekee Beovu-pistoksen jälkeen muutamia silmiin liittyviä kokeita. Hän voi esimerkiksi mitata silmänpaineen tai arvioida näköhermon kuntoa.
- Silmän lasiaiseen pistoksena annettavan hoidon, kuten Beovu-hoidon, jälkeen voi toisinaan ilmaantua seuraavia haittavaikutuksia:
 - harvinainen mutta vakava tulehdus silmässä (endoftalmiitti)
 - vähemmän vakava silmänsisäinen tulehdus
 - immuunireaktio (immunogeenisuus)
 - silmänpaineen tilapäinen nousu on yleistä, mutta siihen ei yleensä liity oireita.

Hoidon jälkeen (jatkuu)

- Verkkokalvon irtauma (melko harvinainen haittavaikutus) tai repeämä (yleinen haittavaikutus) ovat mahdollisia.
- Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:
 - näön äkillinen heikkeneminen tai muutos, kuten näkökenttään ilmaantuvat pienet hiukkaset
 - silmän kipu, punoitus tai epämukava tunne
 - valonvälähdykset.

Mitä voin tehdä hoitoni jälkeen?

- Pistoksen jälkeen näkökykysi saattaa heikentyä tilapäisesti (esim. sumentua). Älä aja tai käytä koneita ennen kuin nämä haittavaikutukset ovat hävinneet.
- Ilmoita lääkärille tai hoitajille, jos huomaat muutoksia näkökyvyssäsi.
- On tärkeää, että noudatat lääkärin suosittelemaa seurantakäyntien aikataulua.

Silmäklinikkasi yhteystiedot:

Yhteyshenkilö: _____

Puhelin: _____

Osoite: _____

Sähköposti: _____



QR-koodista avautuu tämän Beovu-potilasoppaan audioselostus.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:

Fimeaan:

www.fimea.fi

Osoite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea

tai

Myyntiluvan haltijalle:

www.novartis.fi

Osoite: Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh. 010 6133 200, <https://www.report.novartis.com>

Novartis Lääkeinformaatiopalvelu

puh. 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com