Oppaasi Beovu®-hoitoon (brolusitsumabi)

Neovaskulaarisen (kostean) silmänpohjan ikärappeuman (AMD) ja diabeettisen makulaturvotuksen (DME) hoitoon

FA-11640111_22042026
Osa riskinhallintasuunnitelmaa v 8.1
Fimean hyväksymispäivämäärä 03/2026

Mikä on neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan ikärappeuma (AMD)?

Silmänpohjan ikärappeuman kosteasta muodosta on kyse, kun silmän makulan alle muodostuu ja kasvaa poikkeavia verisuonia. Silmän takaosassa sijaitseva makula on silmän tarkan näkemisen alue. Poikkeavista verisuonista voi tihkua nestettä tai verta silmään, mikä voi häiritä makulan toimintaa ja johtaa näkökyvyn heikkenemiseen.

Mikä on diabeettinen makulaturvotus (DME)?

Diabeettinen makulaturvotus on diabeteksen aiheuttama etenevä sairaus, joka voi johtaa peruuttamattomaan näönmenetykseen tai sokeutumiseen. Vaurioituneista verisuonista voi tihkua nestettä silmän makulaan. Makula on tärkeä tarkassa näkemisessä ja sitä käytetään muun muassa lukemiseen, ajamiseen ja kasvojen tunnistamiseen.

FA-11640111_22042026

Miksi minulle on määrätty Beovu®-valmistetta?

Beovun sisältämä vaikuttava aine brolusitsumabi kuuluu uudissuonittumisen estoon käytettävien lääkkeiden ryhmään.

Silmässä verisuonten kasvua aiheuttaa verisuonten endoteelikasvutekijä A -niminen aine eli VEGF-A. Beovu kiinnittyy VEGF-A:han ja estää sitä toimimasta sekä vähentää poikkeavien verisuonten kasvua silmänpohjan ikärappeuman kosteassa muodossa ja diabeettisessa makulaturvotuksessa. Tämä puolestaan vähentää nesteen tai veren tihkumista silmään.

FA-11640111_22042026

Miten Beovu-annostellaan?

- Beovu-valmiste annetaan pistoksena silmän lasiaiseen (intravitreaalinen injektio).
- Beovu-pistoksen jälkeen sinulle saatetaan tehdä muutamia silmiin liittyviä kokeita, kuten silmänpaineen mittaus tai näköhermon kunnon arviointi.

Mitä odottaa hoidon jälkeen?

Silmän lasiaiseen pistoksena annettavan hoidon, kuten Beovu-hoidon, jälkeen voi toisinaan ilmaantua seuraavia haittavaikutuksia:

- melko harvinainen vakava tulehdus silmässä (endoftalmiitti), johon yleensä liittyy silmänsisäinen infektio tai silmän takaosassa olevan kerroksen eli verkkokalvon irtauma tai repeämä
- silmänpaineen tilapäinen nousu on yleistä, mutta siihen ei yleensä liity oireita. Silmänpaineesi voidaan mitata paineen nousun havaitsemiseksi.

FA-11640111_22042026

Tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa


- Verkkokalvon verisuonitulehdusta (verkkokalvon vaskuliitti) ja/tai silmän verisuonten tukkeutumista (verkkokalvon verisuonitukos) tai vähemmän vakavaa silmänsisäistä tulehdusta saattaa esiintyä. Näiden tapahtumien riski on hieman suurempi naisilla ja japanilaista alkuperää olevilla potilailla.
  - Jos sinulla on ollut silmänsisäinen inflammaatio ja/ tai verkkokalvon verisuonitukos viimeisen vuoden aikana, sinulla on suurempi todennäköisyys saada verkkokalvon vaskuliitti ja/tai verkkokalvon verisuonitukos.
- Immuunireaktio (immunogeenisuus) on mahdollinen.

FA-11640111_22042026

Ota välittömästi yhteyttä silmäklinikkaan, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:



Näön äkillinen heikkeneminen tai muutos



Uusia tai aiempaa enemmän pieniä hiukkasia näkökentässä (lasiaiskellujat)



Silmän punoitusta



Uutta tai jatkuvaa silmän kipua tai lisääntynyttä epämukavuuden tunnetta



Valonvälähdyksiä tai lisääntynyttä valoherkkyyttä (kirkkaan valon aiheuttamaa epämukavuutta)

FA-11640111_22042026

Mitä voin tehdä hoitoni jälkeen?

- Pistoksen jälkeen näkökykysi saattaa heikentyä tilapäisesti (esim. sumentua). Älä aja tai käytä koneita ennen kuin nämä haittavaikutukset ovat hävinneet.
- Ilmoita lääkärille tai hoitajille, jos huomaat muutoksia näkökyvyssäsi.
- On tärkeää, että noudatat lääkärin suosittelemaa seurantakäyntien aikataulua.

FA-11640111_22042026

Silmäklinikkasi yhteystiedot:

Yhteyshenkilö: _____

Puhelin: _____

Osoite: _____

Sähköposti: _____

QR-koodista avautuu tämän Beovu-potilasoppaan audioselostus.

Pääset audioselostukseen myös tästä linkistä: uotg.io/9e04500

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:

Fimeaan:
www.fimea.fi
Osoite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea

tai

Myyntiluvan haltijalle:
www.novartis.fi
Novartis Finland Oy, Espoo, puh. 010 6133 200
www.novartis.com/report

Novartis Lääkeinformaatiopalvelu
puh. 010 6133 210, medinfo.nordics@novartis.com

FA-11640111_22042026
Osa riskinhallintasuunnitelmaa v 8.1
Fimean hyväksymispäivämäärä 03/2026