

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Hoitavan lääkärin nimi:

Sairaala:

Aubagio®-lääkkeen ensimmäinen määräämispäivä:

Potilaan nimi:

POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Aubagio®-hoitoa. Katso pakkauselosteesta täydelliset tiedot.



Yleisiä ohjeita

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).



Merkittävät haittavaikutukset

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan. Siksi sinulle tehdään verikokeita ja verenpaineesi mitataan ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti sen jälkeen.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea kuume, vapina, kylmänväreet, turvonneet rauhaset, vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus tai sekavuus. Nämä saattavat viitata infekioon.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkäriille tai hoitohenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

- Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA, www.fimea.fi tai
- Sanofi Oy, pharmacovigilance.finland@sanofi.com, puh: 0201 200 368



Ainoastaan naispotilaat: Raskaus

- Älä aloita Aubagio®-hoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Sinun on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää Aubagio®-hoidon aikana.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, **ota viipymättä yhteys lääkäriin** ja ilmoittaudu Raskausrekisteriin soittamalla numeroon 0201200368 tai sähköpostitse osoitteella pharmacovigilance.finland@sanofi.com.
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa Aubagio®-valmisteen nopeutettua poistamista elimistöstä tietyillä lääkkeillä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää lastasi.