

Käyttöön liittyvät ohjeet

Pronaxen 250 mg tabletit on itsehoidossa tarkoitettu tilapäiseen käyttöön aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla:

- Lievien ja keskivaikeiden kiputilojen oireenmukaiseen itsehoitoon enintään 5 vuorokauden ajan ilman lääkärin määräystä
- Kuumeen alentamiseen itsehoidossa enintään 3 vuorokauden ajan ilman lääkärin määräystä

Annostus

- 1 tabletti tarvittaessa 1–2 kertaa vuorokaudessa
- Maksimiannos itsehoidossa on 500 mg vuorokaudessa

Muista antaa asiakkaalle aina toimittamisen yhteydessä Pronaxenin Potilaan opas.

Käyttöön liittyvä rajoitus

Samanaikainen muiden tulehduskipulääkkeiden käyttö lisää ruuansulatuskanavaan kohdistuvia haittoja, jotka voivat olla hengenvaarallisia.

- Yhteiskäyttöä muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa pitää ehdottomasti välttää

Soveltuvuus itsehoitoon

Varmista lisäneuvonnan aikana, että Pronaxenin loppukäyttäjän ikä on vähintään 12 vuotta. Mikäli sairaushistoriaa ja lääkitystä kysyttäessä tulee esille jokin alla olevista esteistä Pronaxenin itsehoitokäytölle, ei valmistetta saa toimittaa. Listaa ei tarvitse käydä yksityiskohtaisesti läpi.

Esteet Pronaxen 250 mg tabletin itsehoitokäytölle:

- käyttö alle 12-vuotiaalle lapselle
- maha- tai pohjukaissuolihaava
- aikaisempi mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin
- aikaisempi ruuansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
- lääkärin toteama alttius ruuansulatuskanavan verenvuodoille
- sairaus, joka heikentää veren hyytymistä (verenvuototauti eli hemofilia tai verihiutaleiden vähäisyys eli trombosytopenia)
- verenhiyttymistä tai veritulppien muodostumista estävä lääkitys (esim. varfariini)
- sydämen vajaatoiminta tai sepelvaltimotauti
- munuaisten vajaatoiminta
- vaikea maksan vajaatoiminta
- verenpainetauti
- astma tai allergia naprokseenille, asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille tai Pronaxenin jollekin muulle aineelle

Raskaus

- Valmistetta ei tule luovuttaa raskaana oleville ennen kuin asiakas on keskustellut lääkärin kanssa ja valmiste on ehdottoman vasta-aiheinen viimeisen kolmen raskauskuukauden aikana

Muista antaa asiakkaalle aina toimittamisen yhteydessä Pronaxenin Potilaan opas.