

Pronaxen 250 mg (naproxen), inflammationshämmande värkmedicin
Receptfritt läkemedel som kräver extra rådgivning (10 tabletter, egenvårdsförpackning)

Anvisningar om användning

Inom egenvård är Pronaxen 250 mg tabletter avsedda för tillfällig användning hos vuxna och ungdomar över 12 år:

- För symtomatisk egenvård av lindriga och medelsvåra smärttillstånd i högst 5 dygn utan läkarordination
- För att sänka feber inom egenvård i högst 3 dygn utan läkarordination

Dosering

- 1 tablett vid behov 1–2 gånger om dygnet
- Maximal dos inom egenvård är 500 mg om dygnet

Kom alltid ihåg att ge Pronaxen patientguiden till kunden i samband med expedieringen.

Begränsning av användning

Samtidig användning med andra inflammationshämmande värkmediciner ökar biverkningar i magtarmkanalen som kan vara livsfarliga.

- Samtidig användning med andra inflammationshämmande värkmediciner måste absolut undvikas

Lämplighet för egenvård

Försäkra dig i samband med tilläggsrådgivningen om att slutanvändarens ålder är minst 12 år. I fall det gällande sjukdomshistoria och medicinerings framkommer något av de nedan listade hindren för användning av Pronaxen inom egenvård, får preparatet inte expedieras. Listan behöver inte gås igenom utförligt.

Hinder för användning av Pronaxen 250 mg tabletter inom egenvård:

- användning hos barn under 12 år
- sår i magen eller tolvfingertarmen
- tidigare sår i magen eller tolvfingertarmen som har återkommit en eller flera gånger
- tidigare hål (perforation) i magtarmkanalen eller blödningar (t.ex. svart eller blodig avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner
- läkardiagnostiserad benägenhet för blödningar i magtarmkanalen
- sjukdom som försämrar blodkoagulationen (blödarsjuka [hemofili] eller brist på blodplättar [trombocytopeni])
- läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex. warfarin)
- hjärtsvikt eller kranskärslssjukdom
- nedsatt njurfunktion
- svårt nedsatt leverfunktion
- blodtryckssjukdom
- astma eller allergi mot naproxen, acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande värkmediciner eller något annat innehållsämne i Pronaxen

Graviditet

- Preparatet får inte expedieras till gravida förrän kunden har talat med läkare. Preparatet är ovillkorligt kontraindicerat under den sista graviditetstrimestern

Kom alltid ihåg att ge Pronaxen patientguiden till kunden i samband med expedieringen.