

KINERET[®]-HOITO

Potilaan nimi:

Huoltajan nimi (lapsilla):

Potilaan annos:

Lääkärin nimi ja puhelinnumero:

Tärkeää Stillin tautia koskevaa turvallisuustietoa

Makrofagiaktivaatio-oireyhtymä (MAS) on Stillin taudin vakava komplikaatio. Hoitamattomana se voi olla hengenvaarallinen. MAS-oireyhtymän kehittymisen riski on kohonnut, jos sinulla on infektio tai jos Stillin taudin oireet ovat huonosti hallinnassa. MAS-oireyhtymän oireita voivat olla mm. pitkittynyt korkea kuume, imusolmukkeiden turvotus ja sitkeä ihottuma.

Kineret voi lisätä vakavan infektion riskiä. Oireita voivat olla pitkittynyt korkea kuume, vilunväristykset, yskä, päänsärky ja ihon punoitus ja aristus. Myös pitkittynyt alhaisempi kuume, laihtuminen ja sitkeä yskä voivat olla merkkejä infektiosta.

Jos sinulle ilmaantuu tulehduksen merkkejä tai jos Stillin taudin oireet pahenevat, ota mahdollisimman pikaisesti yhteyttä terveydenhoidon ammattilaisiin.