

# OHJE OLUMIANT®-VALMISTETTA (BARISITINIBIA) MÄÄRÄÄVILLE LÄÄKÄREILLE

Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa potilaiden kanssa tapahtuvaan alkukeskusteluun Olumiant-valmisteen määräämisen yhteydessä. Materiaaliin tulee perehtyä yhdessä oheisen valmisteyhteenvedon kanssa.

Olumiant on selektiivinen, reversiibeli Janus-kinaasien 1 ja 2 (JAK1 ja JAK2) estäjä, joka on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean atooppisen ihottuman (AD) hoitoon aikuisille ja vähintään 2-vuotiaille pediatriksille potilaille, joille harkitaan systeemistä hoitoa, ja vaikean pälvikaljun (AA) hoitoon aikuispotilaille.

Potilaiden kanssa käytävän alkukeskustelun yhteydessä:

- Jokaiselle potilaalle on annettava **potilaskortti**.
- Potilaita on kehotettava lukemaan potilaskortti yhdessä **pakkausselosteen** kanssa.

## Aikuiset:

Barisitinininibin suositusannos on 4 mg kerran vuorokaudessa. 2 mg:n annosta kerran päivässä suositellaan potilaille:

- joilla on suurentunut tromboembolisten laskimotapahtumien, merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien (MACE) ja syövän riski,
- jotka ovat vähintään 65-vuotiaita,
- joilla on ollut kroonisia tai toistuvia infektioita.

4 mg annosta kerran vuorokaudessa voidaan harkita potilaille, joiden tautiaktiivisuutta ei ole saatu hallintaan 2 mg annoksella kerran vuorokaudessa.

2 mg annosta kerran vuorokaudessa on harkittava potilaille, joilla tautiaktiivisuus on saatu pitkäkestoisesti hallintaan 4 mg annoksella kerran vuorokaudessa ja joiden annosta halutaan pienentää.

Katso tarkemmat annostustiedot, myös suositusannos lapsille, valmisteyhteenvedosta.

## Infektiot

Olumiant-valmiste lisää mahdollista infektoriskiä.

Potilaita tulee ohjeistaa hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos infektiin viittaavia merkkejä tai oireita ilmenee.

**Koska infektioiden ilmaantuvuus on yleensä suurempi iäkkäillä ja diabeetikoilla,**

- Varovaisuutta** tulee noudattaa hoidettaessa iäkkäitä ja diabetesta sairastavia potilaita.
- Olumiant-valmistetta tulee käyttää 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille vain, jos muita soveltuvia hoitovaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

## Ohjeista potilasta siihen, että:

- Olumiant-valmisteen käyttö tulee keskeyttää, jos kyseessä on vyöruusu tai jokin muu infektio, joka ei reagoi tavanomaiseen hoitoon, kunnes infektio on ohi.
- Heitä ei saa rokottaa elävillä heikennetyillä rokotteilla juuri ennen Olumiant-hoitoa tai sen aikana.

Lääkkeen määrääjien on seulottava potilaat virushepatiitin varalta ennen Olumiant-hoidon aloittamista. Aktiivinen tuberkuloosi on myös suljettava pois.

Kaikkien potilaiden, erityisesti pediatriksen potilaiden, rokotukset suositellaan päivittämään ajan tasalle voimassa olevien rokotussuositusten mukaisesti ennen Olumiant-hoidon aloittamista.

## Lipidiarvojen muutokset

Olumiant-valmisteen käyttöön on liittynyt hyperlipidemiaa.

Lääkkeen määrääjien on seurattava potilaan lipidiarvoja ja hoidettava hyperlipidemia, mikäli sitä todetaan.

## Laskimotromboembolia

Olumiant lisää laskimotromboosin ja keuhkoembolian riskiä. Olumiant-valmistetta tulee käyttää varoen potilailla, joilla on muita syvän laskimotromboosin/keuhkoembolian riskitekijöitä kuin sydän- ja verisuonisairauksien tai pahanlaatuisien kasvainten riskitekijöitä.

Potilaita tulee neuvoa hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos syvän laskimotromboosin/keuhkoembolian merkkejä tai oireita ilmaantuu.

## Merkittävät sydän- ja verisuonitapahtumat

Merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien (MACE) riski on mahdollisesti kasvanut potilailla, joilla on tiettyjä riskitekijöitä, ja jotka käyttävät JAK-estäjähoitoa, mukaan lukien Olumiant-valmistetta.

**Siksi Olumiant-valmistetta tulee käyttää vain, jos soveltuvia hoitovaihtoehtoja ei ole käytettävissä seuraaville potilaille:**

- 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat
- Nykyisin tupakoivat tai aiemmin pitkään tupakoineet
- potilaat, joilla on muita kardiovaskulaarisia riskitekijöitä.

## Lymfooma ja muut pahanlaatuiset kasvaimet

Lymfoomaa ja muita pahanlaatuisia kasvaimia on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet JAK-estäjiä, mukaan lukien Olumiant-valmistetta.

**Siksi Olumiant-valmistetta tulee käyttää vain, jos soveltuvia hoitovaihtoehtoja ei ole käytettävissä seuraaville potilaille:**

- yli 65-vuotiaat,
- nykyisin tupakoivat tai aiemmin pitkään tupakoineet,
- potilaat, joilla on syöpään liittyviä riskitekijöitä (esim. he ovat sairastaneet tai sairastavat syöpää).

## Raskaus

Olumiant on vasta-aiheinen raskauden aikana, koska prekliiniset tiedot osoittivat hidastunutta sikiön kasvua ja epämuodostumia.

**Siksi,**

- Lääkäreiden tulee **neuvoa** naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, käyttämään ehkäisyä hoidon aikana ja viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen.
- Olumiant-hoito tulee lopettaa, jos harkitaan suunniteltua raskautta.

---

## Haittavaikutuksista ilmoittaminen ja yhteystiedot

Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista sivustolla: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) tai voitte myös raportoida haittavaikutuksista tai tuotevalituksista ottamalla yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan:

Oy Eli Lilly Finland Ab,  
Puh. 0800 140 240 (arkisin 9-15)

Mikäli teillä on kysyttävää Olumiant-valmisteesta, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Lillyn Medical Information -palveluun, puh.0800 140 240 (arkisin 9-15) tai [medinfo\\_finland@lilly.com](mailto:medinfo_finland@lilly.com)

Olumiant-valmisteyhtevedon löydätte Fimean sivuilta [Lääkehaku - Fimea.fi - Fimea](#).

Olumiant® on Eli Lilly and Company -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistama tai lisensoima rekisteröity tavaramerkki

