

TOUJEO® (GLARGININSULIINI 300 yksikköä/ml)

Toujeo® 300 yksikköä/ml SoloStar® injektioneste, liuos, esitäytetty kynä


Toujeo® 300 yksikköä/ml DoubleStar™ injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

OPAS POTILAALLE JATAI HUOLTAJALLE/HOITAJALLE:

- Jos sinulle on määrätty Toujeo® -insuliinia, terveydenhuollon ammattilaisen on opetettava sinulle Toujeo®-kynän käyttö, ja sinun on luettava huolellisesti käyttöohjeet tämän kynän mukana olevasta pakkausselosteesta.
- Tämä on tarkoitettu vain opastukseksi.
- Aloita hoito lääkemääräyksessä mainitulla annoksella.

Tärkeää tietoa Toujeo®-insuliinin annostelusta ensimmäisten käyttöviikkojen aikana

- Glargininsuliini 300 yksikköä/ml (Toujeo®) ja glargininsuliini 100 yksikköä/ml **eivät ole biologisesti samanarvoisia eivätkä siten keskenään vaihtokelpoisia ilman annosmuutoksia.** (Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole sama lääke, ja että niitä ei voida vaihdella keskenään ilman annoksen muuttamista.)
- Yhdestä insuliinihoidosta voidaan siirtyä toiseen vain lääkärin määräyksestä. Terveydenhuollon ammattilaisen antamaa uutta annossuositusta on aina noudatettava.
- Verensokeriasi on seurattava huolellisesti siirtymisen aikana ja ensimmäisinä viikkoina sen jälkeen.
- Toujeo® -insuliini on saatavilla kahdessa eri esitäytetyssä kynässä:



Toujeo® SoloStar® -kynän annosväli on 1 yksikkö ja Toujeo® DoubleStar™ -kynän annosväli on 2 yksikköä.

Pistettävä annos on nähtävissä annosikkunassa.

Kysy lisätietoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Lue pakkausselosteesta oleva käyttöohje ennen Toujeo®-insuliinin pistämistä.

Jos havaitset haittavaikutuksia tai lääkitysvirheen, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, tai ilmoita Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan: www.fimea.fi.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

**Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle:
pharmacovigilance.finland@sanofi.com tai puh. 0201 200 368.**