

ILUVIEN®

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA SISÄLTÄVÄ POTILAAN KOULUTUS- MATERIAALI



Voit kuunnella nämä tiedot äänitallenteena skannaamalla älypuhelimella tämän selosteen oikeassa yläkulmassa oleva QR-koodi.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää silmälääkäriltä tai Alimeralta suurikirjaimisen painetun version. Alimeran yhteystiedot ovat jäljempänä.

TÄRKEITÄ TIETOJA ILUVIEN-IMPLANTAATIN ASETTAMISEN JÄLKEEN SILMISSÄ MAHDOLLISESTI TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA

Injektio saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa silmään infektion tai verkkokalvon muutoksia.

JOS SINULLA ON SEURAAVIA OIREITA, HAKEUDU KIIREELLISESTI LÄÄKÄRIIN:

- näkökyvyn sumenemista tai heikkenemistä
- silmäkipua
- silmän pahenevaa punoitusta
- pilkkuja näkökentässä
- silmien valoyliherkkyys lisääntyy injektion jälkeen
- valon välähdyksiä
- näkökentästä puuttuu osa.

ILUVIEN-injektiosta voi aiheutua myös

- silmänpaineen nousua
- silmän mykiön samentumista (kaihi).

Sinun on siksi käytävä hoitopaikassa vastaanotokäynneillä, jotta lääkäri voi seurata vointiasi säännöllisesti.

Lue täydelliset turvallisuutta koskevat tiedot ILUVIEN-implantaatin pakkausselosteesta.

Se on saatavissa osoitteesta www.fimea.fi

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa.

Lääkäri:

Puhelin:

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

Haittavaikutukset voidaan raportoida myös osoitteeseen:

Alimera Sciences Europe Limited

Sähköposti: pvalimerasciences@alimerasciences.com