

Vad du behöver känna till om LEMTRADA (alemtuzumab)

Kontakta omedelbart din neurolog och informera om dessa symtom, oavsett om de är nya, förvärrade eller återkommande. Om du inte kan komma i kontakt med din egen läkare, sök omedelbart medicinsk vård och visa upp detta kort.

VIKTIGA BIVERKNINGAR ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ:

Allvarliga infektioner

Feber och/eller frossa, trötthet, sjukdomskänsla

Andningssvårigheter, hosta, väsande andning, bröstsmärta eller tryck över bröstet och blodiga upphostningar

Sällsynt infektion i hjärnan som kallas PML (progressiv multifokal leukoencefalopati)

- Ökad svaghet eller klumpighet i armar och ben,
- Synstörning, talsvårigheter eller
- Förändringar i tankemönster, minne och orientering som leder till förvirring och personlighetsförändringar

Allvarliga biverkningar som tillfälligt förknippas med LEMTRADA-infusion (biverkningar som vanligtvis uppkommer inom 1-3 dagar efter infusion)

Hjärtattack

- Bröstsmärta eller obehag, andningssvårigheter, smärta eller obehag i armar, käke, nacke, rygg eller mage
- Yrsel eller ostadighetskänsla, illamående, svettning

Stroke och bristningar i blodkärlen som försörjer hjärnan

- Plötsligt hängande delar av ansiktet, svaghet i ena kroppshalvan, talsvårigheter
- Plötslig svår huvudvärk, nacksmärta

Blödning i lungorna

- Andningssvårigheter, bröstsmärta eller obehag, blodiga upphostningar

Trombocytopeni

- Lätt att få blåmärken och/eller blödningar

Fördröjda biverkningar (kan uppkomma månader till år efter infusion)

Sköldkörtelrubbnings

- Överdriven svettning, oförklarlig viktnedgång eller viktuppgång, svullna ögon, nervositet, snabb hjärtrytm
- Känna sig frusen, trötthet som blir värre eller nyligen uppkommen förstoppning

Immunologisk trombocytopeni (ITP)

- Små utströdda röda, rosa eller lila prickar på huden, spontana eller lätt att få blåmärken, att blödningar från skärsår är svårare att stoppa än vanligt, rikligare, längre eller tätare mensblödningar än vanligt
- Blödning från tandköttet eller näsan som är ny eller tar längre tid än vanligt att stoppa, blodiga upphostningar
- Smärtsamma eller svullna leder

Njursjukdom inklusive antiglomerulär basalmembransjukdom (anti-GBM)

- Blod i urinen som kan vara röd eller ha samma färg som te, svullnad i benen eller fötter

Autoimmun leverinflammation

- Oförklarligt illamående, kräkningar, trötthet, buksmärta, aptitlöshet, buksvullnad
- Gul hud och ögon och/eller mörk urin, blödning eller får blåmärken lättare än normalt.

Hemofagocytisk lymfocytos (HLH)

- Oförklarligt hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet, förstorade lymfkörtlar, gul hud, hudutslag

Förvärvad blödarsjuka

- Blödning från ett skärsår tar längre tid att få stopp på än vanligt
- Spontant uppkomna blåmärken, näsblod, smärtsamma eller svullna leder

Läkare: Läs LEMTRADAs produktresumé för mer information.

- Allvarliga infektioner
- Allvarliga biverkningar som tidsmässigt förknippas med LEMTRADA infusion: hjärtattack, stroke, bristningar i blodkärlen som försörjer hjärnan, blödning i lungorna och trombocytopeni
- Fördöjda biverkningar: sköldkörtelrubbnigar, ITP, njursjukdomar, autoimmun leverinflammation, HLH samt förvärad blodsjuka

LEMTRADA-behandling kan öka risken för:

under minst 48 månader efter min sista behandling.

Jag har behandlats med LEMTRADA, en behandling för multipel skleros (MS), som påverkar immunförsvaret. Jag deltar i ett speciellt uppföljningsprogram som fortsätter

Bär alltid med dig detta patientvarningskort och visa det för all akut- och sjukvårdspersonal som är involverade i din vård för att informera dem om din behandling med LEMTRADA®.

PATIENTVARNINGSKORT

▲ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Min neurolog som ordinerat LEMTRADA kan kontaktas på nedanstående telefonnummer eller e-postadress. Övriga läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal som är involverade i min vård kan också finnas angivna.

Om några medicinska undersökningar genomförs, vänligen skicka kopior på samtliga journaler, inklusive eventuella behandlingar och/eller provsvar, till läkaren(-arna) och sjuksköterskan(-skorna) på nedanstående lista.

Patientens namn:

Patientens namnteckning:

Datum för senaste LEMTRADA-infusion:

	Namn	Telefonnummer	E-postadress
Neurolog			
Husläkare			
MS-sjuk-sköterska			



Tidig upptäckt och diagnos ger dig bästa möjligheten till förbättring.



Du måste även fortsätta att vara uppmärksam på tecken och symtom.



Detta gäller under minst 48 månader efter din sista behandlingssomgång med LEMTRADA.

Det är mycket viktigt att du fortsätter med dina provtagningar varje månad under minst 48 månader (4 år) efter din sista infusion (även om du mår bra). Fördöjda biverkningar kan uppkomma efter 48 månader. Du behöver därför fortsätta att vara uppmärksam på tecken och symtom, även när dina månatliga provtagningar inte längre krävs.