

Cerdelga®  
eliglustaatti

## POTILASKORTTI

### Tietoja potilaalle

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

Pitäkää tämä kortti aina mukanaan ja näyttäkää se kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he tietävät CERDELGA®-hoidostanne.

- Älkää aloittako mitään reseptilääkitystä, itsehoitolääkitystä tai rohdosvalmisteen käyttöä kertomatta siitä lääkärille tai farmaseutille.
- Älkää käyttäkö greippivalmisteita.

## Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta käytetään niiden tyyppin I Gaucher'n tautia (GD1) sairastavien aikuispotilaiden pitkäaikaiseen hoitoon, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

*Lisätietoja saatte valmisteyhteenvedosta.*

### Nopeat ja keskinopeat CYP2D6-metabolioijat:

- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta ei tule käyttää yhdessä vahvan tai kohtalaisen CYP2D6:n estäjän kanssa, kun samanaikaisesti käytetään vahvaa tai kohtalaista CYP3A:n estäjää
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta ei tule käyttää potilaille, jotka ovat nopeita CYP2D6-metabolioijia ja joilla on
  - vaikea maksan vajaatoiminta
  - lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, kun samanaikaisesti käytetään vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmisteen käyttöä ei suositella
  - nopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta
  - keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on minkä tahansa vaikeusasteen maksan vajaatoiminta
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmisteen yhteiskäyttöä vahvan CYP3A:n induktorin kanssa ei suositella
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta tulee käyttää varoen yhdessä seuraavien kanssa:
  - kohtalainen CYP2D6:n estäjä
  - vahva tai kohtalainen CYP3A:n estäjä
  - P-gp:n tai CYP2D6:n substraatti (kyseisten lääkkeiden annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen)

- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta ei suositella nopeille tai keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, eikä keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
- CERDELGA<sup>®</sup>-annos tulee laskea tasolle 84 mg KERRAN päivässä:
  - nopeilla tai keskinopeilla CYP2D6-metabolioijilla, jotka saavat samanaikaisesti vahvaa CYP2D6:n estäjää
  - nopeilla CYP2D6-metabolioijilla, joilla on lievä maksan vajaatoiminta ja jotka saavat heikkoa CYP2D6:n estäjää tai mitä tahansa CYP3A:n estäjää.

### Hitaat CYP2D6-metabolioijat:

- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta ei tule käyttää yhdessä vahvan CYP3A:n estäjän kanssa
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmisteen käyttöä ei suositella hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on minkä tahansa vaikeusasteen maksan vajaatoiminta
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmisteen yhteiskäyttöä seuraavien kanssa ei suositella:
  - vahva CYP3A:n induktori
  - kohtalainen CYP3A:n estäjä
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta ei suositella hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, eikä hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
- CERDELGA<sup>®</sup>-valmistetta tulee käyttää varoen yhdessä seuraavien kanssa:
  - heikko CYP3A:n estäjä
  - P-gp:n tai CYP2D6:n substraatti (kyseisten lääkkeiden annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen).



**Potilaan nimi:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CERDELGA®-hoidon  
aloituspäivämäärä:** \_\_\_\_\_

**Hoitopaikka:** \_\_\_\_\_

**Hoitava lääkäri:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Hoitavan lääkärin  
puhelinnumero:** \_\_\_\_\_