

TYSABRI-hoidon jatkamislomake

Lue tämä lomake huolellisesti ennen kuin jatkat TYSABRI-hoitoa pidempään kuin kaksi vuotta. Vaikka olet saanut TYSABRI-hoitoa kahden vuoden ajan, sinun on tärkeää muistaa, että progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian riski suurenee tämän ajan jälkeen. Noudata tässä lomakkeessa annettuja ohjeita, jotta voidaan varmistaa, että olet täysin tietoinen ja ymmärrät TYSABRI-hoitoon liittyvien progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) ja elpyvän immunitetin tulehdusoireyhtymän (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, IRIS) kehittymisen sekä muiden merkityksellisten haittavaikutusten riskin.

Ennen kuin jatkat TYSABRI-hoitoa

- **lue TYSABRI-pakkauksen sisältämä pakkausseloste**
- **lue lääkäriltä saamasi seurantakortti**
- **keskustele lääkärin kanssa hoidosta odotettavissa olevista hyödyistä ja siihen liittyvistä riskeistä.**

Pakkausselosteessa ja potilaan seurantakortissa on tärkeää progressiiviseen multifokaaliseen leukoenkefalopatiaan (PML) liittyvää turvallisuustietoa. PML on harvinainen aivoinfektio, jota on esiintynyt TYSABRI-hoitoa saaneilla potilailla ja joka saattaa aiheuttaa toimintakyvyn vaikeasteisen heikkenemisen tai johtaa kuolemaan.

PML aiheutuu JC-viruksen hallitsemattomasta lisääntymisestä aivoissa, mutta syytä viruksen tällaiseen lisääntymiseen joillakin TYSABRI-hoitoa saavilla potilailla ei tiedetä. JC-virusta esiintyy ihmisillä yleisesti, mutta se ei tavallisesti aiheuta merkityksellisiä sairauksia.

PML:n riski näyttää olevan TYSABRI-hoidon yhteydessä suurempi

- **jos veressäsi on JC-viruksen vasta-aineita**
- **mitä kauemmin TYSABRI-hoitoa jatketaan, etenkin jos saat hoitoa yli kahden vuoden ajan**
- **jos olet milloin tahansa ennen TYSABRI-hoidon aloittamista käyttänyt immunosuppressoriksi kutsuttua lääkettä (joka heikentää elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa).**

Lääkärin on keskusteltava kanssasi PML:n mahdollisesta riskistä ennen TYSABRI-hoidon jatkamista.

Lääkäri saattaa ottaa sinulta verikokeita tarkistaakseen, onko veressäsi JC-viruksen vasta-aineita ennen TYSABRI-hoidon jatkamista. Lääkäri saattaa ottaa verikokeet uudestaan tarkistaakseen, ettei tilanne ole muuttunut. PML:n riski on suurempi, jos sinulla on kaikki edellä mainitut riskitekijät tai et ole ottanut immunosuppressoriläkettä ennen TYSABRI-hoidon aloittamista ja JC-viruksen vasta-aineiden määrä veressäsi on suurentunut ja olet saanut TYSABRI-hoitoa yli 2 vuoden ajan. Lääkäri seuraa sinua tarkemmin, jos sinulla on suurentunut PML:n riski.

Selvitä lääkärin kanssa, onko TYSABRI sinulle sopivin hoito ennen kuin jatkat TYSABRI-hoitoa yli kaksi vuotta.

Potilaille, joilla on PML, ilmaantuu todennäköisesti elpyvän immunitetin tulehdusoireyhtymäksi (IRIS) kutsuttu reaktio, kun TYSABRI poistuu hoidon jälkeen heidän elimistöstään. IRIS saattaa heikentää potilaan vointia, myös aivojen toimintaa.

Lue pakkausseloste aina, kun saat TYSABRI-hoitoa, koska siinä saattaa olla hoitosi kannalta tärkeitä uusia tietoja.

Pidä potilaan seurantakortti mukana muistuttamassa hoitoon liittyvistä tärkeistä turvallisuustiedoista, etenkin PML:ään mahdollisesti viittaavista oireista. Näytä seurantakorttia myös puolisollesi tai hoitajallesi.

Jos sinulla ei ole pakkausselostetta tai potilaan seurantakorttia, pyydä ne lääkäriltä ennen kuin jatkat TYSABRI-hoitoa.

Potilaan nimi _____

Lääkärin nimi _____

Allekirjoitus _____

Allekirjoitus _____

Päivämäärä _____

Päivämäärä _____

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea


Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

TYSABRI on biologinen lääke, joten terveydenhuollon ammattilaisten pitää haittavaikutuksia raportoidessaan mainita valmistein kauppanimi ja eränumero.

PML:n riskiarvio



Potilaat, joiden JC-virusvasta-ainemääritys on negatiivinen

Maailmanlaajuisen aineiston perusteella todennäköisyys saada PML on 0,1/1 000 potilaasta (tai 1/10 000 potilaasta), jos veressä ei ole JC-virusen vasta-aineita.

Potilaat, joiden JC-virusvasta-ainemääritys on positiivinen

Jos veressä on JC-virusen vasta-aineita, PML:n riski riippuu TYSABRI-hoidon kestosta, JC-virusen vasta-aineiden määrästä veressä ja aiemmasta immunosuppressori-lääkityksen käytöstä. Lääkäri keskustelelee kanssasi mahdollisesta riskistä ennen hoidon jatkamista.