Allvarliga infektioner

Andra allvarliga infektioner kan inträffa vid behandling med TYSABRI. Tala med din läkare så fort som möjligt om du tror att du fått en allvarlig och långvarig infektion, exempelvis långvarig feber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via:
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA

Biogen-102723
Version 1
Godkänt av Fimea: 06/2026

Biogen Finland Oy
www.biogen.fi (på finska)

PATIENTKORT FÖR TYSABRI™

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Startdatum TYSABRI-behandling:

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter avslutad behandling med TYSABRI.

- Visa detta kort för alla behandlande läkare, inte endast neurologen.
- Läs bipacksedeln för TYSABRI noggrant innan du påbörjar behandlingen.
- Ha det här kortet med dig under TYSABRI-behandlingen och i sex månader efter sista TYSABRI-dosen eftersom biverkningar kan uppstå även efter avslutad behandling.
- Visa det här kortet för din partner eller vårdgivare. De kan upptäcka symtom på PML som du själv inte ser, till exempel förändrat humör eller beteende, minnesluckor, tal- och kommunikationssvårigheter. Du bör vara fortsatt uppmärksam på symtom som kan uppstå i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYSABRI.
- **Om du ger dig själv TYSABRI-injektionerna med förfyllda sprutor, eller om en anhörig/vårdgivare ger dig injektionerna, ska listan med PML-symtom gås igenom före varje dos. Gå igenom checklistan före administrering innan TYSABRI injiceras.**

Före behandling med TYSABRI

- Du ska inte behandlas med TYSABRI om du har allvarliga problem med immunsystemet.
- Du ska inte ta några andra läkemedel för långvarig behandling av multipel skleros medan du får TYSABRI.

Under behandling med TYSABRI

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

PML är en ovanlig hjärninfektion, som har förekommit hos patienter som har behandlats med TYSABRI. PML leder ofta till allvarlig funktionsnedsättning eller död.

Risken för PML förefaller öka med behandlingstiden, i synnerhet efter mer än två års behandling.

Symtomen på PML kan likna ett MS-skov. Om du tror att din MS försämras eller om du upptäcker nya symtom under behandling med TYSABRI eller i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYSABRI är det därför viktigt att du talar med din läkare så fort som möjligt. PML-symtom utvecklas i allmänhet långsammare än symtom för ett MS-skov (över dagar eller veckor), men kan likna MS-symtom.

Tecken kan vara:

- förändringar i mental förmåga och koncentration
- beteendeförändringar
- svaghet i ena sidan av kroppen
- synstörningar
- nya hjärn- eller nervrelaterade symtom som är ovanliga för dig.

Behandling av PML kräver att behandlingen med TYSABRI upphör omedelbart.