

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille, esim. hammaslääkärille tai päivystyspoliklinikan lääkäriille.

Lue lisätiedot pakkausselostesta tai skannaamalla alla oleva QR-koodi.



www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

Nimesi:

RINVOQ®-valmistetta
määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

RINVOQ®-hoidon aloittamispäivä:

Versio 1.0. Hyväksytty 17.10.2019.

FI-RNQ-190001/RMP/31.3.2021

AbbVie Oy
Puhelin 010 2411 200

abbvie

POTILASKORTTI

Pidä kortti aina mukanas

RINVOQ®-valmisteen
(upadasitinibi) turvallisuutta
koskevaa tietoa potilaille



Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle www.fimea.fi tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle (AbbVie Oy).

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen RINVOQ®-hoidon aloittamista ja jotka on pidettävä mielessä hoidon aikana.

Infektioiden riski

RINVOQ[®] voi pahentaa sinulla jo olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion, esim. tuberkuloosin, vyöruusun tai virushepatiitin, todennäköisyyttä.

Kerro heti lääkärille, jos huomaat infektion merkkejä, joita ovat mm.

- kuume, hikoilu, vilunväristykset, painon lasku tai yskä, joka ei parane – nämä voivat olla tuberkuloosin oireita
- kivulias ihottuma, johon liittyy rakkulamuodostusta – tämä voi olla vyöruusun oire
- väsymys tai hengenahdistus – nämä voivat olla keuhkokuumeen oireita.

Rokotteet, joita käytetään infektioiden ehkäisyyn

Eläviä rokotteita (esim. nenäsumutteena annettava influenssarokote) ei pidä antaa RINVOQ[®]-hoidon aikana eikä juuri ennen RINVOQ[®]-hoidon aloittamista.

Keskustele lääkärin kanssa ennen minkään rokotteen antamista. Lääkäri tietää, mitä rokotteita sinulle ei saa antaa ennen RINVOQ[®]-hoitoa tai sen aikana.

Kolesteroli

Lääkäri tutkii kolesteroliarvosi RINVOQ[®]-hoidon aikana, jotta saadaan selville, onko sinun aloitettava lääkitys kolesteroliarvojen pienentämiseksi.

Ehkäisy, raskaus ja imetys

RINVOQ[®]-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

- Käytä tehokasta ehkäisyä RINVOQ[®]-hoidon aikana ja 4 viikon ajan viimeisen annoksen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa tehokkaasta ehkäisystä.
- Kerro heti lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai tulet raskaaksi.
- RINVOQ[®]-hoidon aikana ei saa imettää.

Veritulppa laskimossa (syvä laskimotukos) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian oireita, kuten jalan kivuliasta turvotusta tai rintakipua.