

## TIETOJA HOIDOSTASI

Sinulle on määrätty Lixiana-valmistetta, antikoagulanttia, joka ohentaa vertasi ja auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista. On tärkeätä, että otat lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.

- Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sen jälkeen seuraavana päivänä normaalisti; älä ota määrättyä annosta kahta kertaa samana päivänä.
- Älä aloita mitään muuta lääkitystä (ilman reseptiä saatavat valmisteet mukaan lukien) kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä.

- Älä lopeta Lixiana-valmisteen ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa, sillä se voi lisätä verihyytymän kehittymisen riskiä.
- Lue Lixiana-pakkauksen sisältämä pakkausseloste.

## KYSY NEUVOA LÄÄKÄRILTÄ

### VERENVUOTORISKI

Lixiana-valmisteen kaltaisen antikoagulantin ottaminen voi lisätä verenvuotoriskiäsi. Siksi on tärkeätä, että olet tietoinen verenvuodon mahdollisista merkeistä ja oireista ja että kerrot lääkärille **välittömästi**, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista:

- Mustelmat tai verenvuoto ihon alla
- Verta virtsassa
- Veriset yskökset
- Veriset tai jauhetulta kahvilta näyttävät oksennukset
- Hitaasti tyrehtyvä verenvuoto nenästä tai haavasta

- Tervan värinen uloste
- Heitehuimaus tai äkillinen päänsärky
- Selittämätön väsymys
- Poikkeava emätinverenvuoto, mukaan lukien runsaampi tai pitkittynyt kuukautisvuoto

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla ilmenee mitä tahansa epätavallisia oireita.

## POTILASKORTTI

**Lixiana®**

tabletti, kalvopäällysteinen  
**edoksabaani**

Pidä tämä kortti aina mukanas.

Esitä kortti terveydenhuoltohenkilöstölle, apteekkihenkilökunnalle, kirurgille tai hammaslääkärille ennen lääketieteellistä hoitoa tai toimenpidettä.

## POTILAAN TIEDOT

Potilaan nimi:

.....

Syntymäaika: .....

Yhteystiedot hätätapauksessa:

Nimi: .....

Puhelinnumero:

.....

## TIETOJA HOIDOSTA

(Lääkäri täyttää)

Lixianan-valmisteen kerran  
vuorokaudessa otettava määrätty  
annos on: ..... mg

Hoito aloitettu:     /     (kk/vv)

Veriryhmä:.....

Muut lääkkeet/sairaudet:

.....

.....

.....

## LÄÄKKEEN MÄÄRÄJÄN TIEDOT

Yhteystiedot lisätietoja varten tai  
hätätapauksessa:

Lääkärin nimi:

.....

Puhelinnumero, lääkärin  
vastaanoton leima:

Lääkärin allekirjoitus:

.....

## TIETOJA TERVEYDEN- HUOLLON AMMATTILAISILLE

- Lixiana on suun kautta otettava hyytymistekijä Xa:n estäjä.
- Kun invasiivinen toimenpide on välttämätön, Lixiana-valmisteen antaminen on lopetettava vähintään 24 tuntia ennen toimenpidettä, ja asiaankuuluvaa varovaisuutta on noudatettava.
- Lixiana saattaa lisätä verenvuotoriskiä. Jos kliinisesti merkittävää verenvuotoa esiintyy, lopeta hoito välittömästi.

- Hyytymiskokeet, kuten INR-arvo, protrombiiniaika (PT) tai aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika (aPTT) eivät ole hyödyllisiä menetelmiä Lixiana-valmisteen vaikutuksen määrittämiseen. Kalibroitu anti-FXa-määritys saattaa kuitenkin olla avuksi kliinisten päätösten teossa.

Ks. lisätietoja  
valmisteyhteenvedosta.

 ORGANON®

 Daiichi-Sankyo

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Copyright © 2021 Daiichi Sankyo.