

## OM DIN BEHANDLING

Du har ordinerats Lixiana, ett blodförtunnande läkemedel, som förtunnar ditt blod och bidrar till att förhindra att du får blodproppar. Det är viktigt att du tar ditt läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar.

- Om du missar en dos ska du ta den omedelbart och sedan fortsätta följande dag som vanligt – ta inte dubbel ordinerad dos samma dag.
- Börja inte ta andra läkemedel (däribland receptfria) utan att rådfråga läkare.

- Sluta inte att ta Lixiana utan att rådfråga läkare, eftersom det kan öka risken för att du får en blodpropp.
- Läs bipacksedeln som finns i varje förpackning med Lixiana.

## NÄR DU SKA SÖKA LÄKARE

### RISK FÖR BLÖDNING



När du tar ett blodförtunnande läkemedel såsom Lixiana kan risken för blödning öka.



Det är därför viktigt att du är uppmärksam på eventuella tecken och symtom på blödning och att du **omedelbart** talar med läkare om du får något av följande:

- blåmärken eller blödning under huden
- blod i urinen
- upphostning av blod
- uppkräkning av blod eller material som ser ut som kaffesump

- näsblod eller sår som tar lång tid att sluta blöda
- svartfärgad avföring
- yrsel eller plötslig huvudvärk
- oförklarlig trötthet
- onormal blödning från slidan, däribland kraftigare eller långvariga menstruationer

Tala med läkare om du får några ovanliga symtom.

MSD-Y2(SE) 113716



## PATIENTKORT

**Lixiana**<sup>®</sup>

filmdragerade tabletter

**edoxaban**

Ha alltid detta kort med dig.

Visa det för hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal, kirurg eller tandläkare före medicinsk behandling eller operation.

FI-OCP-00059 10/2020 8.10.2020

## PATIENTINFORMATION

Patientens namn:

.....

Födelsedatum: .....

I nödsituation, kontakta:

Namn:

.....

Telefonnummer:

.....

## BEHANDLINGSINFORMATION

(Ifylls av läkare)

Lixiana har ordinerats i en dos på:

..... mg en gång dagligen

Började den:     /     (mm/åå)

Blodgrupp: .....

Andra läkemedel/tillstånd:

.....

.....

.....

.....

## FÖRSKRIVARINFORMATION

För mer information eller vid nödsituation, kontakta:

Läkarens namn:

.....

Telefonnummer, praktikens stämpel:

Läkarens namnteckning:

.....

## INFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

- Lixiana är ett oralt antikoagulant som är en faktor Xa-hämmare.
- När det behövs en invasiv åtgärd ska Lixiana sättas ut minst 24 timmar före och lämplig försiktighet iakttas.
- Lixiana kan öka blödningsrisken. Vid kliniskt signifikant blödning avbryts behandlingen omedelbart.

- Koagulationstester såsom internationell normaliserad kvot (INR), protrombintid (PT) eller aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) är inte användbara mått på effekten av Lixiana. En kalibrerad anti-faktor Xa-analys kan bidra med information inför kliniska beslut.

Se produktresumén för mer information.



Product under license of  
Daiichi-Sankyo Europe GmbH

FI-OCP-00059 10/2020 8.10.2020