

Potilaskortti

Sivu 1 (etukansi)

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin (pulmonaaliarteriahypertensio) hoitoon

Tämä kortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa Opsumit-hoidosta. Pidä kortti aina mukana ja näytä se kaikille sinua hoitaville lääkäreille.

Opsumit 10 mg
masitentaani
kalvopäällysteinen tabletti

FI

Sivu 2

On tärkeää, että ilmoitat Opsumit-hoidon aikana ilmenneestä raskaudesta tai haittavaikutuksesta heti lääkettä määränneelle lääkärille.

Hoitopaikka: _____

Lääkettä määränneen lääkärin nimi: _____

Lääkettä määränneen lääkärin puhelinnumero: _____

Sivu 3 (sisäpuoli, vasen)

Raskaus

Opsumit voi vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen. Tästä syystä Opsumitia ei saa ottaa raskauden aikana eikä saa tulla raskaaksi Opsumit-hoidon aikana. Jos sinulla on keuhkovaltimoiden verenpainetauti, raskaus voi pahentaa taudin oireita vaikeasti.

Ehkäisy

Opsumit-hoidon aikana on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisymenetelmää. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Sivu 4 (sisäpuoli, keskikohta)

Sinun on tehtävä raskaustesti ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et epäilisisikään olevasi raskaana.

Muiden tämän luokan lääkkeiden tavoin Opsumit voi aiheuttaa anemiaa (veren punasolujen vähäisyys) ja vaikuttaa maksaan. Lääkärisi otattaa ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja hoidon aikana verikokeita, joilla tutkitaan seuraavat seikat:

- anemia (veren punasolujen vähäisyys)
- maksan toiminta

Sivu 5 (sisäpuoli, oikea)

Maksan toimintahäiriön oireita voivat olla mm:

- pahoinvointi (oksettava olo)
- oksentelu
- kuume
- vatsakipu
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- virtsan tummuus
- ihon kutina
- poikkeuksellinen väsymys tai uupumus
- flunssankaltaiset oireet (nivel- ja lihaskipu ja kuume)

Jos sinulla on jokin näistä oireista, ilmoita asiasta heti lääkärille.

Sivu 6 (takakansi)

Suositusannos on yksi Opsumit 10 mg tabletti kerran vuorokaudessa. Nielaise tabletti kokonaisena vesilasillisen kera. Tablettia ei saa pureskella eikä murtaa. Lääkkeen voi ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Jos unohdat ottaa Opsumit-tabletin, ota annos heti kun muistat ja jatka tablettien otto tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Lue huolellisesti pakkausseloste, joka sisältää lisätietoa Opsumitista. Jos sinulla on kysyttävää hoidosta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.