

Potilaskortti

Sivu 1 (etukansi)

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin (pulmonaaliarteriahypertensio) hoitoon

Tämä kortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa Opsumit-hoidosta. Pidä kortti aina mukana ja näytä se kaikille sinua hoitaville lääkäreille.

Opsumit 10 mg
masitentaani
kalvopäällysteinen tabletti

FI

Sivu 2

On tärkeää, että ilmoitat Opsumit-hoidon aikana ilmenneestä raskaudesta tai haittavaikutuksesta heti lääkettä määränneelle lääkärille.

Hoitopaikka: _____

Läkettä määränneen lääkärin nimi: _____

Läkettä määränneen lääkärin puhelinnumero: _____

Sivu 3 (sisäpuoli, vasen)

Raskaus

Opsumit voi vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen. Tästä syystä Opsumitia ei saa ottaa raskauden aikana etkä saa tulla raskaaksi Opsumit-hoidon aikana. Jos sinulla on keuhkovaltimoiden verenpainetauti, raskaus voi pahentaa taudin oireita vaikeasti.

Ehkäisy

Opsumit-hoidon aikana on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisy menetelmää. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Sivu 4 (sisäpuoli, keskikohta)

Sinun on tehtävä raskaustesti ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et epäilisiäkään olevasi raskaana.

Muiden tämän luokan lääkkeiden tavoin Opsumit voi vaikuttaa maksaan. Lääkäri otattaa ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja hoidon aikana verikokeita, joilla tutkitaan maksan toimintaa.

Sivu 5 (sisäpuoli, oikea)

Maksan toimintahäiriön oireita voivat olla mm:

- pahoinvointi (oksettava olo)
- oksentelu
- kuume
- vatsakipu
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- virtsan tummuus
- ihon kutina
- poikkeuksellinen väsymys tai uupumus
- flunssankaltaiset oireet (nivel- ja lihaskipu ja kuume)

Jos sinulla on jokin näistä oireista, ilmoita asiasta heti lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.