

Patientkort

Sida 1 (framsida)

För behandling av pulmonell arteriell hypertension

Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till när du behandlas med Opsumit. Bär alltid med dig det här kortet och visa det för alla läkare som är involverade i din vård.

Opsumit 10 mg
macitentan
filmdragerade tabletter

SV

Sida 2

Det är viktigt att du omedelbart rapporterar graviditet eller eventuella biverkningar som inträffar under behandling med Opsumit till din förskrivande läkare.

Vårdinrättning: _____

Namn på förskrivande läkare: _____

Telefonnummer till förskrivande läkare: _____

Sida 3 (insida vänster)

Graviditet

Opsumit kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Opsumit om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Opsumit. Dessutom, om du har pulmonell arteriell hypertension (høgt blodtryck i lungorna), kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom.

Preventivmedel

Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar Opsumit. Tala med din läkare om du har frågor kring detta.

Sida 4 (insida mitten)

Du måste göra ett graviditetstest innan du börjar ta Opsumit och varje månad under behandlingen, även om du inte tror att du är gravid.

Liksom andra läkemedel i denna grupp kan Opsumit orsaka anemi (minskat antal röda blodkroppar) och påverka levern. Din läkare kommer att ta blodprover innan du påbörjar behandlingen med Opsumit och under behandlingen, för att kontrollera:

- om du har anemi (minskat antal röda blodkroppar).
- om din leverfunktion är normal.

Sida 5 (insida höger)

Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara:

- Illamående (önskan att kräkas)
- kräkningar
- feber (høg temperatur)
- mag-/buksmärta
- gulsot (guldfärgning av hud och ögonvitor)
- mörkfärgad urin
- kliande hud
- dvalliknande tillstånd eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning)
- influensaliknande symtom (led- och muskelsmärter med feber)

Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om detta för din läkare.

Sida 6 (baksida)

Rekommenderad dos av Opsumit är en 10 mg-tablett en gång dagligen. Svälj tablettens hel med ett glas vatten. Tablettens får inte tuggas eller delas. Du kan ta Opsumit med eller utan mat.

Om du har glømt att ta Opsumit ska du ta dosen så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan ta tablettens vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glømd tablett.

Läs bipacksedeln noggrant för ytterligare information om Opsumit. Fråga läkare eller apotekspersonal om du har frågor kring din behandling.