

<p>Namn, patient:</p> <p>Namn, läkare:</p> <p>Telefonnummer, läkare:</p> <p>Datum för påbörjad behandling med Remsima:</p> <p>Senaste behandlingar:</p>	<p>Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.</p> <p>Lista över andra läkemedel:</p> <p>Lista över allergier:</p>	<p>Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:</p> <p>Undersökning:</p> <p>Datum:</p> <p>Resultat:</p> <p>Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsnumret på ditt läkemedel.</p> <p>Produktnamn:</p> <p>Tillverkningsnumret:</p>	<p>Patientkort</p> <p>SV FI DK</p> <p>Remsima[®] infiximab</p> <p>Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.</p>	<p>Potilaan nimi:</p> <p>Lääkäriin nimi:</p> <p>Lääkäriin puh.nro:</p> <p>Remsima-hoito aloitettu:</p> <p>Annetut infuusiot:</p>	<p>Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämästäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.</p> <p>Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:</p> <p>Allergiat:</p>	<p>Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:</p> <p>Menetelmä:</p> <p>Päiväys:</p> <p>Tulos:</p> <p>On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.</p> <p>Kaupanimi:</p> <p>Eränumero:</p>	<p>Potilaskortti</p> <p>SV FI DK</p> <p>Remsima[®] infiximabi</p> <p>Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.</p>	<p>Patientens navn:</p> <p>Lægens navn:</p> <p>Lægens telefonnummer:</p> <p>Dato for start på Remsima-behandling:</p> <p>Nuværende doseringer:</p>	<p>Du skal sikre dig, at du ved hvert lægebesøg også medbringer en liste over alle andre lægemidler, som du bruger.</p> <p>Liste over anden medicin:</p> <p>Liste over allergier:</p>	<p>Du skal bede din læge om at notere type og dato for seneste screening (er) for tuberkulose (TB) nedenfor:</p> <p>Test:</p> <p>Dato:</p> <p>Resultat:</p> <p>Det er vigtigt, at du og din læge noterer produktnavn og lot-nummeret på din medicin.</p> <p>Præparatnavn:</p> <p>Batchnummer:</p>	<p>Patient Informationskort</p> <p>SV FI DK</p> <p>Remsima[®] infiximab</p> <p>Vis dette kort til enhver læge, der er involveret i Deres behandling.</p>
---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---

- Pantone 361 C
- Pantone 7496 C
- Pantone 186 C
- Black



83

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

Fold

<p>Dette patient informationskort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Remsima.</p> <p>Behold dette kort som reference i 4 måneder efter din sidste Remsima-dosis, når du starter på et nyt kort.</p> <p>Læs indlægssedlen for Remsima grundigt, inden De begynder at tage medicinen.</p> <p>Opbevar dette kort på dig i 4 måneder efter du har fået din sidste dosis din sidste dosis Remsima, eller i tilfælde af graviditet i 12 måneder, efter du har født. Bivirkninger kan forekomme lang tid efter sidste dosis.</p>	<p>Infektioner </p> <p>Før behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortæl din læge, hvis du har en infektion, også selvom det er en meget let infektion. Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft tuberkulose (TB), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Din læge vil teste dig for at se, om du har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type og dato for din(e) seneste screening(er) for TB på kortet. Fortæl din læge, hvis du har hepatitis B, eller hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B virus. 	<p>Under behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortæl straks din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthed, vægttab, natlig svedtendens, diarré, sår, tandproblemer, en brændende smerte, når du lader vandet, eller influenzalignende symptomer. 	<p>Graviditet, amning og vaccinationer</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis du har fået Remsima, mens du var gravid, eller hvis du ammer, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, før dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose) inden for 12 måneder efter fødslen, eller mens du ammer, medmindre barnets læge anbefaler noget andet. 	<p>Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remsima-hoidon aloitusta ja sen aikana.</p> <p>Kun aloitat uuden kortin, säilytä tämä kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan viimeisen Remsima-annoksen jälkeen.</p> <p>Lue Remsima-valmisteen pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.</p> <p>Pidä tämä kortti mukana 4 kuukauden ajan viimeisimmän Remsima-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, 12 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.</p>	<p>Infektioit </p> <p>Ennen Remsima-hoitoa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin. On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin. Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja. 	<p>Remsima-hoidon aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kivelyä virtsassa tai flunssan kaltaisia oireita. 	<p>Raskaus, imetys ja rokotukset</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos olet saanut Remsima-valmistetta raskauden aikana tai jos imetat, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 12 kuukauteen syntymän jälkeen tai imetyksen aikana, ellei lastasi hoitava lääkäri toisin suosittele. 	<p>Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remsima.</p> <p>När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Remsima.</p> <p>Läs noga Remsima bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.</p> <p>Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Remsima-dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.</p>	<p>Infektioner </p> <p>Före behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet. Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus. 	<p>Under behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinerings eller influensaliknande symtom. 	<p>Graviditet, amning och vaccinationer</p> <ul style="list-style-type: none"> Om du har fått Remsima under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få "levande vacciner", såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---

Perforation