

Namn, patient:

Namn, läkare:

Telefonnummer, läkare:

Datum för påbörjad behandling med Remsima:

Senaste behandlingar:



Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Lista över andra läkemedel:

Lista över allergier:

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:

Undersökning:

Datum:

Resultat:

Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverknings-satsnumret på ditt läkemedel.

Produktnamn:

Tillverknings-satsnummer:



LM100807-PA007

Patientkort

SV FI NO

Remsima[®]
influximab

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

Potilaan nimi:

Lääkäriin nimi:

Lääkäriin puh.nro:

Remsima-hoito aloitettu:

Allergiat:

Annetut infuusiot:

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeitä, kun menet vastaanotolle.

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeitä:

Allergiat:

Pyydä lääkärinä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

Menetelmä:

Päiväys:

Tulos:

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.

Kaupanimi:

Eränumero:



LM100807-PA007

Hyväksytty 03/2021

Potilaskortti

SV FI NO

Remsima[®]
influximabi

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

Pasientnavn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Dato for oppstart av Remsimabehandling:

Nåværende administrering:

Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.

Liste over andre legemidler:

Liste over allergier:

Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelsen(e) for tuberkulose (TB) under:

Test:

Dato:

Resultat:

Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og batchnummeret til legemidlet som blir gitt til deg.

Handelsnavn:

Batchnummer:



LM100807-PA007

Pasientkort

SV FI NO

Remsima[®]
influximab

Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Remsima.

Når et nytt kort tas i bruk, behold dette kortet som referanse i 4 måneder etter din siste dose med Remsima.

Vennligst les pakningsvedlegget til Remsima nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Remsima eller ved graviditet, i minst 6 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.

| Infeksjoner |

Før Remsimabehandling

- Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig.

- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet.

- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

Under Remsimabehandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

| Graviditet og vaksiner |

- Hvis du fikk Remsima da du var gravid er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 6 måneder etter fødselen.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remsima-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämä kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan viimeisen Remsima-annoksesi jälkeen.

Lue Remsima-valmisteeseen pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Pidä tämä kortti mukana 4 kuukauden ajan viimeisen Remicade-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, vähintään 6 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänsikin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

| Infektiot |

Ennen Remsima-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.

- On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.

- Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

Remsima-hoidon aikana

- Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

| Raskaus ja rokotukset |

- Jos olet saanut Remsima-valmistetta raskauden aikana, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. apsellesi ei saa antaa elävää rokotetta”, kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 6 kuukauteen syntymän jälkeen.

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remsima.

När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Remsima.

Läs noga Remsima bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Remsima dos, eller i händelse av graviditet, i minst 6 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

| Infektioner |

Före behandling med Remsima

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.

- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.

- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus.

Under behandling med Remsima

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

| Graviditet och vaccinationer |

- Om du har fått Remsima under din graviditet, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få ”levande vacciner”, såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter födseln.