

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Hoitavan lääkärin nimi:

Sairaala:

Aubagio®-lääkkeen ensimmäinen määräämispäivä:

Potilaan nimi:

# POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Aubagio®-hoitoa. Katso pakkauselosteesta täydelliset tiedot.



## Yleisiä ohjeita

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).



## Merkittävät haittavaikutukset

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan, verenpaineeseen ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan.

### Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea lämpö (kuume), yskä, kylmänväreet, turvonneet rauhaset tai vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus. Nämä saattavat viitata infekioon.

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

- Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA, [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) tai
- Sanofi Oy, [pharmacovigilance.finland@sanofi.com](mailto:pharmacovigilance.finland@sanofi.com), puh: 0201 200 300

### Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/huoltajansa:

- Älä aloita Aubagio®-hoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää Aubagio®-hoidon aikana ja sen jälkeen. Lääkäri antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos haluat tulla raskaaksi.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta teriflunomidin käyttö ja **ota viipymättä yhteys lääkäriin**.
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää lastasi.
- Tyttöjen vanhemmat/huoltajat: ottakaa yhteys lääkäriin, kun potilaan ensimmäiset kuukautiset alkavat, jotta hänelle voidaan antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja ehkäisyn tarpeesta.

