

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Hoitavan lääkärin nimi:

Sairaala:

Aubagio®-lääkkeen ensimmäinen määräämispäivä:

Potilaan nimi:

POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Aubagio®-hoitoa. Katso pakkauselosteesta täydelliset tiedot.



Yleisiä ohjeita

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).



Merkittävät haittavaikutukset

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan, verenpaineeseen ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea lämpö (kuume), yskä, kylmänväreet, turvonneet rauhaset tai vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus. Nämä saattavat viitata infekioon.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

- Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA, www.fimea.fi tai
- Sanofi Oy, pharmacovigilance.finland@sanofi.com, puh: 0201 200 368

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/huoltajansa:

- Älä aloita Aubagio®-hoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää Aubagio®-hoidon aikana ja sen jälkeen. Lääkäri antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos haluat tulla raskaaksi.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta teriflunomidin käyttö ja **ota viipymättä yhteys lääkäriin** ja ilmoittaudu Raskausrekisteriin soittamalla numeroon 0201200368 tai sähköpostitse osoitteella pharmacovigilance.finland@sanofi.com.
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää lastasi.
- Tyttöjen vanhemmat/huoltajat: ottakaa yhteys lääkäriin, kun potilaan ensimmäiset kuukautiset alkavat, jotta hänelle voidaan antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja ehkäisyn tarpeesta.

